

Aerva lanata

synonyma: *Achyranthes lanata*, *Achyranthes villosa*, *Aerva elegans*, *Aerva floribunda*, *Aerva lanata*, *A. f. grandifolia*, *A. f. microphylla*, *A. f. squarrosa*, *A. var. elegans*, *A. var. intermedia*, *A. var. leucuroides*, *A. var. oblonga*, *A. var. oblongata*, *A. var. pseudojavanica*, *A. var. rhombea*, *A. var. suborbicularis*, *Aerva pubescens*, *Aerva sansibarica*, *Aerva tandalo*, *Aerva viridis*, *Alternanthera pubescens*, *Amaranthus aeruoides*, *Amaranthus lanatus*, *Celosia lanata*, *Illecebrum lanatum*

čeleď: *Amaranthaceae*

oblasti: Benin, Demokratická Republika Kongo (Zair), Etiopie, Filipíny, Ghana, Indie, Indonésie, Kamerun, Keňa, KwaZulu-Natal, Libérie, Madagaskar, Malajsie, Malawi, Mosambik, Nigérie, Pákistán, Papua-Nová Guinea, Pobřeží Slonoviny, Queensland, Rwanda, Saudská Arábie, Sierra Leone, Somálsko, Srí Lanka, Tanzánie, Togo, Transvaal, Uganda, Zimbabwe

Roste v Asii, Africe a Austrálii. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky (0,1 -) 0,3 - 1,8 (i 2)m. Stonky jsou větvené od báze. Listy jsou střídavé, eliptické až mírně kopinaté, špičaté, dlouhé (1 -) 1,3 - 3,8 (i 5)cm, široké 0,5 - 3,5cm a řapíky jsou dlouhé do 2cm. Květenství je dlouhé 0,4 - 1,5 (i 2)cm a široké 3 - 4mm.

<https://www.rostliny.net/>