

Stephania corymbosa

synonyma: *Clypea corymbosa*, *Stephania catosepala*, *Stephania hernandiifolia*, *Stephania menadonensis*, *Stephania merrillii*, *Stephania ramosii*, *Stephania ramuliflora*

čeleď: Menispermaceae

oblasti: Borneo, Filipíny, Jáva, Malajsie, Malajský poloostrov, Sulawesi (Celebes), Sumatra

Roste v jihovýchodní Asii v podobě dřevité liány. Dorůstá délky 5 - 12m při průměru 1 - 2cm. Listy jsou široce 3úhlé, špičaté, dlouhé 3,5 - 19cm, široké 3 - 17cm, okraj může být podvinutý a řapíky jsou dlouhé 3 - 19cm. Samčí květenství je úžlabní, dlouhé 3 - 15cm, tvořené z okoličnatých vrcholíků s délkou 1,5 - 9cm, vlastní květy jsou v případě samčích bílé, nažloutlé nebo oranžové, mají 3 - 5mm stopky, 6 kališních lístků, 3 korunní lístky; samičí květenství má květy přisedlé, asymetrické, 3 kališní lístky a 1 - 2 korunní. Plodem je červená prakticky přisedlá kulovitá peckovice délky 0,6 - 1cm a šířky 6 - 8mm.

<https://www.rostliny.net/>