

Launaea intybacea

synonyma: *Brachyramphus caribaeus*, *Brachyramphus goraeensis*, *Brachyramphus heyneanus*, *Brachyramphus intybaceus*, *Brachyramphus remotiflorus*, *Brachyramphus schimper*, *Brachyramphus sonchifolius*, *Brachyramphus taraxacoides*, *Chondrilla indica*, *Chondrilla sonchifolia*, *Cicerbita intybacea*, *Lactuca caribaea*, *Lactuca goraeensis*, *Lactuca goraeensis* var. *effusa*, *Lactuca goraeensis* var. *glomerata*, *Lactuca heyneana*, *Lactuca intybacea*, *Lactuca nudicaulis* var. *major*, *Lactuca pinnatifida*, *Lactuca remotiflora*, *Lactuca runcinata*, *Lactuca schimper*, *Lactuca taraxacoides*, *Launaea goraeensis*, *Launaea remotiflora*, *Launaea stocksiana*, *Phoenixopus intybaceus*, *Prenanthes sonchifolia*, *Scorzonera africana*, *Scorzonera pinnatifida*, *Sonchus calyculatus*, *Sonchus goraeensis*, *Sonchus spachii*, *Zollikoferia stocksiana*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Afrika, Florida, JZ Asie, Pákistán, Portoriko, Texas

Roste v USA a střední Americe, na východě tropické Afriky, jihozápadní a jižní Asii jako vzpřímená větvená jednoletka. Dorůstá výšky 0,15 - 1,5m. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou obvejčité až lžičkovité, zašpičatělé až špičaté, zubaté až peřeně laločnaté s 3 - 5ti páry laloků, dlouhé 3 - 37cm, široké 1 - 14cm, báze je sbíhavá, laloky jsou hluboké až 2cm, terminální má délku až 6cm, lodyžní listy jsou pak menší. Květenstvím je úbor s (12 -) 18 - 35ti květy na 0,1 - 2 (i 4)cm stopce, zákrov je úzce válcovitý, 3 - 4řadý, dlouhý 0,9 - 1,3cm, vnější zákrovní lístky jsou vejčité, špičaté, dlouhé 1 - 2mm, střední špičaté, dlouhé 1 - 1,2cm, vnitřních bývá 8, úzce kopinaté, dlouhé (0,8 -) 0,9 - 1,3cm, široké 1 - 2mm, okvětní lístky jsou dlouhé 5 - 6mm, terčové květy žluté, dlouhé 5,5 - 6mm a široké 1 - 1,4mm. Plodem je nažka délky 3 - 4,5mm se 4 - 5ti hlavními a 8 - 10ti vedlejšími podélnými rýhami a chmýrem délky 7 - 8mm.

<https://www.rostliny.net/>