

Forsskaolea tenacissima

synonyma: *Caidbeja adhaerens*, *Forsskaolea cossoniana*, *Forsskaolea latifolia*

čeleď: Urticaceae

oblasti: Afganistán, Andalusie, Egypt, Indie, Írán, Izrael, Jemen, JV Španělsko, Maroko, Mauretánie, Niger, Pákistán, Palestina, S Afrika, Saudská Arábie, Somálsko, Střední střeozemí

Roste na západním a jižním střeozemí, dále v Mauretánii, Somálsku a přes Arabský poloostrov po Indii v podobě trvalky. Dorůstá výšky (15 -) 20 - 60 (i 80)cm. Povrch je štětinatě ochlupený. Stonky jsou přímé, načervenalé. Palisty jsou vejčité, dlouhé 3 - 5mm a široké 1,5 - 2,5mm. Listy jsou střídavé, obvejčité až kosočtvercovité, vroubkované, štětinaté, šedozelené, dlouhé 1 - 3 (i 4,5)cm, široké (0,7 -) 0,8 - 3 (i 3,7)cm, spodní strana je bíle plstnatá a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 2,5 (i 3)cm. Kvete jednopohlavnými květy v klubíčkách (5 - 8 samčích, 2 - 6 samičích) v paždí listů s 5ti dlouze brvitými listeny a kalich je nestejně 3laločný. Plodem je mírně vejčitá červenohnědá nažka délky 3mm.

Vyhovují ji suchá kamenitá místa na plném slunci.

<https://www.rostliny.net/>