

Micromeria (Drobnozel)

čeleď: Lamiaceae

Roste v tropech a subtropických podobě trvalky až keře. Lodyhy jsou poléhavé až vystoupavé. Listy jsou celokrajné nebo zubaté. Květenstvím je úžlabní lichopřeslen, hrozen nebo je latnaté, vlastní květy mají trubkovitý kalich s 5ti laloky, je mírně 2pyský, má 15 žilek, koruna je 2pyská, bílá, růžovofialová nebo červená, horní pysk je vzpřímený, obvykle drobnější a spodní 3laločný. Plodem je hladký oříšek nebo tvrdka. Vydává aroma.

Vyhovuje ji plné slunce a lehká půda. Je mrazuvzdorná.

Množí se semeny nebo dřevitými řízky.

Micromeria acropolitana

synonyma: *Satureja acropolitana*

oblasti: Střední Řecko

Roste v Řecku v podobě keře. Dorůstá výšky 10 - 30cm. Povrch je prakticky holý. Větve jsou vzpřímené. Listy jsou dlouze kopinaté, tupé, dlouhé 5mm a široké 1 - 2mm. Květenstvím je max. 10tičetných lichopřeslen, vlastní květy jsou růžovofialové a dlouhé 5 - 8mm.

Vyhovují mu skalní pukliny, plné slunce, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Micromeria albanica

synonyma: *Satureja albanica*

oblasti: Albánie

Micromeria arganietorum

synonyma: *Satureja arganietorum*

Micromeria barosma

synonyma: *Calamintha barosma*, *Satureja barosma*

oblasti: Yunnan

Roste v Číně v podobě polokeře. Dorůstá výšky 20 - 40cm. Větve jsou v mládí růžovofialovočervené. Listy jsou kopinaté až obkopinaté, celokrajné, nadvinuté, mírně tupé, dlouhé 4 - 6mm, široké 2 - 3mm a řapíky jsou dlouhé 0,5mm. Květenstvím je 1 - 2četný lichopřeslen seskupený po 3 - 7mi ks v terminálním klasu, má listeny, stopky květů jsou dlouhé 2mm, kalich narůžovofialovělý, dlouhý 9mm, koruna je růžová až růžovofialová, dlouhá 1,8cm, horní pysk dlouhý 6mm, široký 3mm a spodní je dlouhý 7mm. Plodem je holý oříšek délky 1,3mm. Vydává aroma.

Micromeria benthamii

synonyma: *Clinopodium benthamii*, *Clinopodium tenue*, *M. tenuis*, *Satureja benthamii*

oblasti: Makaronésie

Patří mezi endemity Gran Canaria v podobě od báze větveného polokeře. Dorůstá výšky 30 (i 40)cm. Větve jsou přímé nebo vystoupavé. Listy jsou vstřícné, úzce čárkovité, podvinuté, řidce ochlupené, na spodní straně ochlupené a přisedlé. Květenstvím je chudý prakticky přisedlý lichopřeslen, vlastní květy jsou 2pyské, bílé nebo narůžovělé s růžovofialovými skvrnami, dlouhé 0,7 - 1cm. Plodem je tvrdka.

Vyhovují mu řídké borové lesy se skalnatým základem.

Micromeria biflora

synonyma: *Clinopodium biflorum*, *M. biflora* var. *indica*, *Satureja biflora*, *Thymus biflorus*

oblasti: Afganistán, Bhútán, Guizhou, Kašmír, Myanmar (Barma), Nepál, Pákistán, SZ Indie, V Himálaj, Yunnan, Z Himálaj

Roste od Číny po Afganistán v podobě trsnatého polokeře. Dorůstá výšky (10 -) 15 - 30cm. Povrch je ochlupený. Listy jsou vejčité, celokrajné, špičaté, žlutě žláznaté, dlouhé 0,4 - 0,5 (i 1)cm, široké 2,5 - 3 (i 5)mm, báze kulatá až mělce srdčitá a řapíky jsou dlouhé do 0,5mm. Květenstvím je chudý 1 - 5tičetný lichopřeslen, listeny jsou malé, čárkovité, vlastní květy mají 2 - 3mm stopku, kalich se 2mi pysky délky 3 - 4mm, koruna je růžová, dlouhá 6 - 7mm, horní pysk dlouhý 2mm, spodní 2,5mm. Plodem je hnědý podlouhlý oříšek délky 1mm, šířky 0,6mm.

Vyhovují ji středně úrodné a vlhké půdy na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízky.

Micromeria brivesii

synonyma: *Satureja brivesii*

Micromeria browiczii

Micromeria chionistrae

synonyma: *Satureja chionistrae*

Micromeria conferta

synonyma: *M. juliana* var. *conferta*, *Satureja conferta*

Micromeria cremnophila

synonyma: *Clinopodium cremnophilum*, *Satureja cremnophila*

oblasti: Albánie, JV Evropa, Libanon, Malá Asie (Anatolie), Řecko, Sýrie

Roste od jihovýchodní Evropy po západní Asii v podobě polokeře. Dorůstá výšky 5 - 15cm. Listy

jsou dlouze vejčité a dlouhé 4 - 7mm. Květenství je štíhlé, dlouhé 3 - 10cm, tvořené 2 - 6tičtnými přesleny v klasu, vlastní květy růžovofialové a dlouhé 3 - 4mm.

Vyhovují mu skalní pukliny, plné slunce, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Micromeria cristata

synonyma: *Clinopodium cristatum*, *M. cristata f. albiflora*, *M. cristata f. canescens*, *M. cristata var. canescens*, *M. cristata var. glandulosa*, *Satureja cristata*, *Thymus cristatus*, *Zygis cristata*

oblasti: JV Evropa, Z Asie

Roste od jihovýchodní Evropy po západní Asii v podobě polokeře. Dorůstá výšky 10 - 20cm. Povrch je krátce ochlupený. Listy jsou malé, kopinaté, tupé, žilnatinu tvoří 3 žilky a báze je přisedlá. Květenstvím je 3četný úžlabní klasovitý vrcholík tvořený květy v růžovofialové až červené barvy.

Vyhovují mu skalní pukliny, plné slunce, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Micromeria croatica

synonyma: *Calamintha piperella*, *M. croatica f. glabrata*, *M. croatica f. linearilanceolata*, *M. croatica f. multicaulis*, *M. croatica f. ovalifolia*, *M. piperella*, *M. serpyllifolia*, *M. subcordata*, *Satureja croatica*, *Satureja croatica f. glabrata*, *Thymus croaticus*, *Thymus piperella*, *Thymus subcordatus*

oblasti: Albánie, Chorvatsko

Roste v Chorvatský v podobě keře. Dorůstá výšky 5 - 15cm. Větve jsou poléhavé až vystoupavé a ochlupené. Listy jsou drobné, špičaté a vejčité. Květy malými růžovými kvítky se spodním 3laločným pyskem a korunou délky 1 - 1,5cm v latě o délce 1 - 2,5cm.

Vyhovují mu skalní pukliny, plné slunce, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Micromeria cymuligera

synonyma: *Clinopodium cymuligerum*, *Satureja cymuligera*

Micromeria dalmatica

synonyma: *M. organifolia*, *Satureja dalmatica*, *Thymus organifolius*

oblasti: Dalmácie

Patří mezi endemity Chorvatska.

Micromeria danaensis

oblasti: Izrael

Micromeria debilis

synonyma: Satureja briquetii

Micromeria densiflora

Micromeria douglasii

synonyma: Clinopodium douglasii, M. barbata, M. chamissonis, Satureja chamissonis, Satureja douglasii, Thymus chamissonis, Thymus douglasii

oblasti: JZ USA, SZ USA, Z Kanada

Roste na západním pobřeží Severní Ameriky v kobercových porostech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Stonky jsou poléhavé a dokáží znovu zakořenit. Listy jsou vejčité, vroubkované, ochlupené a dlouhé 1,5 - 2,5cm. Květy jsou samostatné, bílé nebo narůžovofialovělé, mají 1 - 1,5cm stopky a jejich délka je max. 8mm.

Vyhovují ji středně úrodné a vlhké dobře propustné půdy v polostínu.

Množí se semeny nebo řízky.

Micromeria elegans

oblasti: Kavkaz

Roste na Kavkaze v podobě polokeře. Vytváří více vystoupavých až vzpřímených krátce ochlupených zelených kmínků s výškou 5 - 9cm. Listy jsou úzce kopinaté, spodní mohou být vejčité, špičaté, podvinuté, celokrajné, tečkovaně žláznaté a báze je přisedlá. Kvete po 1 - 3ks v paždí listů, mají 1 - 2mm stopky, seskupené do klasovitého květenství, listeny jsou čárkovité, dlouhé 1,5mm, kalich trubkovitý, dlouhý 3 - 4mm, bývá nafialovělý, koruna má horní hluboce vykrojený pysk, spodní je větší, 3laločný a tyčinek má 4ks.

Micromeria elliptica

synonyma: Clinopodium ellipticum, M. calvertii, M. elegans, M. elliptica var. nana, M. pubescens, Satureja kochii

oblasti: Kavkaz, Malá Asie (Anatolie)

Roste na Kavkaze a Turecku v podobě polokeře. Dorůstá výšky 10 - 20cm. Povrch může být mírně draslavý. Kmínky jsou vystoupavé až vzpřímené, dlouhé 8 - 15cm. Listy jsou čárkovité, spodní až vejčité, podvinuté, prakticky tupé a báze je přisedlá. Květenstvím je 1 - 3 (i 4)četný lichopřeslen seskupený do hroznu či klasu, vlastní květy jsou krátce stopkaté, kalich trubkovitě zvonkovitá a korunu je velmi drobná.

Vyhovují mu skalní pukliny, plné slunce, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Micromeria euosma

synonyma: *Calamintha euosma*, *Satureja euosma*

oblasti: Yunnan

Roste v Číně v podobě polokeře. Dorůstá výšky 15 - 30cm. Listy jsou široce vejčité, řídce jemně vroubkované, zaoblené, dlouhé 1 - 2cm, široké 0,5 - 1,3cm a řapíky jsou dlouhé 2 - 4mm. Květenstvím je 2 - 10tičetný lichopřeslen seskupený po 3 - 7mi ks v latě, listeny jsou dlouhé 5mm, široké 1,5mm, vlastní květy mají 2,5 - 4mm stopky, kalich délky 5mm, koruna je tmavěčervená, dlouhá 1cm, horní pysk je podlouhlý a spodní je dlouhý 5mm. Vydává aroma.

Micromeria filiformis

synonyma: *Clinopodium filiforme*, *M. filiformis* var. *glandulosa*, *M. glandulosa*, *Piperella filiformis*, *Satureja filiformis*, *Satureja microphylla* subsp. *filiformis*, *Thymus filiformis*

oblasti: Baleáry, Korsika, Sardínie

Roste na Baleárách, Korsice a Sardínií v podobě bohatě větveného keře. Dorůstá výšky 5 - 20cm. Větve jsou nitkovité a vystoupavé. Listy jsou vejčité až 3úhlé, dlouhé 2 - 5mm, široké 1,5 - 4mm, celokrajné a prakticky přisedlé. Květenstvím je 2 - 4četný lichopřeslen, vlastní květy mají stopky, kalich délky 3 - 4mm a koruna je bílá, dlouhá 4,5 - 5,5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *cordata*/M. *cordata*/*Clinopodium cordatum*/*Satureja cordata* - Sardínie; výška 5 - 20cm; prakticky holá; větve nitkovité, vystoupavé; listy vejčité až 3úhlé, prakticky tupé, celokrajné, téměř přisedlé; květenstvím je 2 - 4četný přeslen, vlastní květy jsou dlouhé 4 - 6mm
- subsp. *filiformis*
- subsp. *minutifolia*

Vyhovují mu skalní pukliny, plné slunce, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Micromeria flacca

synonyma: *Satureja flacca*

oblasti: Irák, Malá Asie (Anatolie)

Roste v Iráku a Turecku v podobě polokeře. Dorůstá výšky 5 - 15cm. Povrch je šedě plstnatý. Větve jsou tenké, spletité. Listy jsou drobné, dlouze vejčité, tupé a řapíkaté. Květenstvím je 2 - 5tičetný vrcholík, vlastní květy jsou modré a stopkaté.

Vyhovují mu skalní pukliny, plné slunce, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Micromeria flagellaris

synonyma: *M. rutenbergiana*, *Satureja flagellaris*

Micromeria fontanesii

synonyma: *Satureja battandieri*, *Satureja filiformis*

Micromeria forbesii

synonyma: *Clinopodium forbesii*, *Satureja forbesii*

oblasti: Makaronésie

Roste na Kapverdských ostrovech v podobě bohatě větveného keře. Dorůstá výšky 50cm. Listy jsou vstřícné, obvejčité, drobně ochlupené, celokrajné, špičaté a krátce řapíkaté. Květenstvím je terminální lichopřeslen, koruna je bleděfialová až růžová a mírně 2pyská. Plodem je tvrdka.

Vyhovují mu kamenité mělké sušší půdy.

Micromeria fruticosa

synonyma: *M. marifolia*

oblasti: Itálie, Izrael, Jugoslávie, Krym, Španělsko

Roste od Španělska po Krym v podobě keře. Dorůstá výšky 30 - 60cm. Povrch je bíle ochlupený. Listy jsou kopinaté až vejčité, celokrajné až zubaté, ploché, dlouhé 0,5 - 2cm a široké 0,2 - 1,2cm. Květenstvím je 10 - 30 (i 50)tičetný lichopřeslen, vlastní květy mají kalich délky 2 - 3,5mm, korunu bělavou a dlouhou 0,5 - 1cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *fruticosa* - Španělsko, Itálie; listy na spodní straně tečkované; kalich a stopky květu sametové, kalich obvejčitě turbkovitý
- subsp. *serpyllifolia*/*M. marifolia*/*M. serpyllifolia*/*Nepeta serpyllifolia*/*Satureja serpyllifolia* - Jugoslávie až Krym; trvalka; výška 15 - 30cm; listy vejčité, krátce řapíkaté; květenstvím je bohatý lichopřeslen, kalich ochlupený, dlouhý 2,5 - 3mm, koruna světle růžovofialová, tmavě tečkovaná, horní pysk krátký a vykrojený, spodní delší

Micromeria glomerata

synonyma: *Satureja anagae*

Micromeria graeca (Mikromerie řecká)

synonyma: *Clinopodium graecum*, *M. calamithoides*, *M. calamithoides* var. *contracta*, *M. calamithoides* var. *elongata*, *M. canescens*, *M. cosentina*, *M. diffusa*, *M. echioides*, *M. echioides* var. *angustifolia*, *M. echioides* var. *gossypina*, *M. echioides* var. *griseocanescens*, *M. echioides* var. *humillima*, *M. echioides* var. *strigosa*, *M. graeca* subsp. *micrantha*, *M. graeca* var. *angustifolia-canescens*, *M. graeca* var. *latifolia*, *M. graeca* var. *rariflora*, *M. graeca* var. *rupestris*, *M. grandis*, *M. grandis* var. *humilior*, *M. lacaitae*, *Satureja canescens*, *Satureja congesta*, *Satureja gorganica*, *Satureja graeca*, *Satureja graeca* subsp. *congesta*, *Satureja graeca* subsp. *macrotricha*, *Satureja graeca* subsp. *micrantha*, *Satureja graeca* var. *canescens*, *Satureja graeca* var. *congesta*, *Satureja graeca* var. *leptiloba*, *Satureja graeca* var. *micrantha*, *Satureja micrantha*, *Satureja sessiliflora*, *Satureja sicula* var. *canescens*, *Thymus hirtus*, *Thymus micranthus*, *Thymus virgatus*

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Baleáry, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Černá Hora, Francie, J Itálie, JV Evropa, Katalánsko, Korsika, Kosovo, Kréta, Libanon, Makedonie, Maroko,

Portugalsko, Řecko, S Itálie, Sardínie, Sicílie, Slovinsko, Srbsko, Střední Itálie, Sýrie, Tunisko, Turecko

Roste ve středomoří v podobě polokeře. Dorůstá výšky 10 - 30 (i 60)cm. Povrch je plstnatý. Stonky jsou vystoupavé a větvené. Listy jsou střídavé, vejčité až úzce kopinaté, podvinuté, dlouhé 0,7 - 1,2 (i 1,4)cm a široké 1 - 7mm. Květenství tvoří 2 - 18tičetný lichopřeslen objevující se v paždí listů, vlastní květy mají nálevkovitý kalich délky (2 -) 3 - 5 (i 6)mm, koruna je bledě růžovofialová a dlouhá (0,5 -) 0,6 - 0,8 (i 1,3)cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *consentina*/*Satureja consentina* - jižní Itálie, Sicílie; povrch lepkavě ochlupený; řídký 2 - 6tičetný lichopřeslen, korunní trubka dlouhá 5 - 6mm, kvete na podzim
- subsp. *fruticulosa*/*Thymus fruticosus* - jižní Itálie, Albánie, Jugoslávie, Sardínie, Sicílie; povrch ochlupený; 1 - 4četný lichopřeslen, korunní trubka dlouhá 4 - 6mm, kvete na jaře
- subsp. *garganica*/*Satureja gracae* subsp. *garganica* - jihovýchod Itálie; řídké min. 4četné lichopřesleny, korunní trubka dlouhá 4 - 6mm, kvete na jaře
- subsp. *graeca* - povrch ochlupený; lichopřeslen 14 - 18tičetný, kvete na jaře
- subsp. *imperica*/*M. thymoides* - severozápadní Itálie; větve nitkovité, listy čárkovité
- subsp. *longiflora* - střední a jižní Itálie, Sicílie; povrch srstnatý; horní listy trochu širší; lichopřesleny hustější
- subsp. *tenuifolia* - Itálie, Sardínie, Sicílie; krátce ochlupené; lichopřesleny 2 - 4četné, květy přisedlé, korunní trubka dlouhá 2 - 3mm, kvete na jaře

Vyhovují mu skalní pukliny, plné slunce, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Micromeria guichardii

synonyma: *Satureja guichardii*

Micromeria hedgei

oblasti: Írán

Micromeria helianthemifolia

synonyma: *Clinopodium helianthemifolium*, *M. helianthemifolia* f. *albiflora*, *M. helianthemifolia* f. *glomerata*, *Satureja despreauxii*, *Satureja helianthemifolia*

oblasti: Makaronésie

Patří mezi endemity Gran Canaria v podobě polokeře. Dorůstá výšky 10 - 40cm. Větve jsou vystoupavé. Listy jsou prakticky terminální, kopinaté, podvinuté, žláznaté, žilkované a přisedlé. Květy bývají v terminálních klasech, koruna je růžová až bílá a 2pyská.

Vyhovují mu skalní pukliny a plné slunce.

Micromeria herpyllomorpha

synonyma: *M. perezii*, *M. serpyllimorpha*, *Satureja herpyllomorpha*, *Satureja perezii*

Micromeria hispida

synonyma: *Clinopodium hispidum*, *M. hispida*, *Satureja candica*, *Satureja graeca* var. *hispida*, *Satureja hispida*

oblasti: Kréta

Roste na Krétě v podobě keře. Dorůstá výšky 10 - 30cm. Povrch je ochlupený. Větve jsou nitkovité, poléhavé nebo vystoupavé a větvené. Listy jsou 3úhle vejčité až eliptické, špičaté, celokrajné, dlouhé 3 - 6mm, široké 2 - 4mm a báze je prakticky přisedlá. Květenstvím je 1 - 6tičetných lichopřeslen, vlastní květy jsou stopkaté, kalich má délku 4 - 5mm, koruna růžovofialová a dlouhá 5 - 8mm.

Micromeria hochreutineri

synonyma: *Satureja hochreutineri*

Micromeria hyssopifolia

synonyma: *Satureja hyssopifolia*, *Satureja kuegleri* var. *hyssopifolia*

Micromeria imbricata

synonyma: *Clinopodium imbricatum*, *M. biflora* var. *cinereotomentosa*, *M. biflora* var. *hirsuta*, *M. biflora* var. *punctata*, *M. forsskalii*, *M. microphylla* var. *imbricata*, *M. microphylla* var. *remota*, *M. neumannii*, *M. ovata*, *M. ovata* var. *cinereotomentosa*, *M. perrottetii*, *M. punctata*, *M. purtschelleri*, *M. quartiniana*, *M. schimperi*, *Satureja biflora* var. *cinereotomentosa*, *Satureja contardoi*, *Satureja imbricata*, *Satureja ovata*, *Satureja ovata* var. *cinereotomentosa*, *Satureja punctata*, *Satureja punctata* subsp. *ovata*, *Satureja punctata* var. *rigida*, *Satureja quartiniana*, *Satureja remota*, *Satureja schimperi*, *Thymus cavaleriei*, *Thymus imbricatus*

oblasti: Eritrea, Jemen, Jihoafrická Republika (JAR), Kamerun

Roste od JAR po Arabský poloostrov v podobě polokeře. Dorůstá výšky 20 - 40cm. Větve jsou přímé nebo vystoupavé a mohou být ochlupené. Listy jsou vstřícné, podlouhlé, kožovité, celokrajné, podvinuté, špičaté, dlouhé 0,5 - 1cm, široké 2 - 5,5mm a řapíky jsou krátké. Květenstvím je až 20tičetný lichopřeslen či vidlan, má listeny, vlastní květy růžové, kalich trubkovitý, koruna 2pyská a dlouhá 0,6 - 1cm. Plodem je tvrdka. Je aromatický.

Vyhovují mu suché kamenité půdy.

Micromeria inodora

synonyma: *Clinopodium inodorum*, *M. approximata* subsp. *barceloi*, *M. barceloi*, *Satureja barceloi*, *Satureja fontanesii*, *Satureja inodora*, *Thymus hispanicus*, *Thymus inodorus*, *Thymus mutisii*

oblasti: Andalusie, Baleáry

Roste ve Španělsku a Baleárách v podobě bohatě větveného stálezeleného keře. Dorůstá výšky 10 - 30cm. Povrch je ochlupený. Větve jsou vzpřímené. Listy jsou husté, svazčité, podvinuté, dlouhé 2 - 3 (i 4)mm a široké 0,5 - 1,2mm. Květenstvím bývá 2četný hustý lichopřeslen, vlastní květy mají 4mm ochlupený kalich velikosti 3 - 5mm, koruna růžovofialová a dlouhá 0,8 - 1cm.

Micromeria juliana

synonyma: *Clinopodium julianum*, *M. juliana f. barbulata*, *M. juliana f. latifolia*, *M. juliana var. angustifolia*, *M. juliana var. hirsuta*, *M. juliana var. latifolia*, *M. reinholdii*, *Sabbatia corymbosa*, *Satureja hirsuta*, *Satureja juliana*, *Satureja juliana f. barbulata*, *Satureja parviflora*, *Satureja sophia*, *Satureja spicata*, *Satureja virgata*

oblasti: Itálie, JV Evropa, JZ Evropa, S Afrika, Středozemí, Z Asie

Roste ve středozemí v podobě stálezeleného nebo poloopadavého polokeře. Dorůstá výšky 10 - 20 (i 40)cm. Povrch je ochlupený. Větve jsou poléhavé až vzpřímené. Listy jsou vejčité (výše položené kopinaté), celokrajné, podvinuté, dlouhé 0,3 - 1,3cm a široké 1 - 2,5mm. Květenstvím je přisedlý nebo krátce stopkatých 4 - 20tičetný lichopřeslen, listeny má dlouhé jako kalich a to 2,5 - 3,5mm, koruna je světle růžovofialová a dlouhá 5mm.

Micromeria kernerii

synonyma: *Satureja kernerii*

oblasti: Jugoslávie

Roste v Jugoslávii v podobě polokeře. Dorůstá výšky 20 - 30cm. Listy jsou krátce ochlupené, vejčité až mírně srdčité, okraje ohrnuté a dlouhé 3 - 9mm. Květenstvím je 6 - 10tičetný přeslen, vlastní květy mají krátké stopky, jsou růžovofialové a dlouhé 3 - 4mm.

Vyhovují mu skalní pukliny, plné slunce, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Micromeria lachnophylla

synonyma: *Clinopodium julianoides*, *Clinopodium teydense*, *M. julianoides*, *M. teydensis*, *Satureja julianoides*, *Satureja lachnophylla*, *Satureja teydensis*

Micromeria lanata

synonyma: *Clinopodium lanatum*, *Satureja lanata*

oblasti: Makaronésie

Patří mezi endemity Gran Canaria v podobě bohatě větveného polokeře. Dorůstá výšky 10cm. Větve jsou poléhavé, na vrcholu vystoupavé a ochlupené. Listy jsou dužnaté, jehlicovité a tříbřitě ochlupené. Květy jsou malé, kalich ochlupený, dlouhý do 2cm, koruna je bílá nebo narůžovělá a 2pyská.

Vyhovují mu sutě v borových lesích.

Micromeria lasiophylla

synonyma: *Satureja lasiophylla*

Micromeria lepida

synonyma: *Clinopodium lepidum*, *M. pitardii*, *Satureja lepida*, *Satureja pitardii*

Micromeria leucantha

synonyma: Satureja leucantha

Micromeria longipedunculata

synonyma: Clinopodium parviflorum, M. parviflora, M. parviflora f. effusa, M. parviflora f. monantha, M. parviflora f. multiantha, M. parviflora f. rubrotincta, Satureja inodora, Satureja parviflora

oblasti: Albánie, Jugoslávie

Roste v Albánii a Jugoslávii v podobě polokeře. Dorůstá výšky 5 - 25cm. Listy jsou vejčité až srdčité, vrcholové i čárkovité a dlouhé 0,4 - 1cm. Květenstvím je 2 - 6tičetný přeslen na dlouhé stopce, vlastní květy jsou růžovofialové a dlouhé 5 - 7mm.

Vyhovují mu skalní pukliny, plné slunce, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Micromeria macrosiphon

synonyma: Satureja macrosiphon

Micromeria madagascariensis

oblasti: Madagaskar

Micromeria marginata

synonyma: Calamintha croatica, M. piperella, Micronema piperella, Satureja marginata, Satureja piperella, Tendana piperella, Thymus allionii, Thymus marginatus, Thymus piperella, Thymus valderius

oblasti: Francie, Itálie, Sardínie

Roste ve Francii, Itálii a Sardínii. Listy jsou vejčité, celokrajné, dlouhé 0,6 - 1,2cm a báze může být i srdčitá. Květenstvím je hrozen tvořící klasovité laty a vlastní květy jsou dlouhé 1,2 - 1,6cm.

Micromeria microphylla

synonyma: Clinopodium microphyllum, M. biflora var. rodriguezii, M. cypria, M. filiformis subsp. rodriguezii, M. graeca var. pauciflora, M. knochei, M. microphylla subsp. rodriguezii, M. nervosa subsp. rodriguezii, M. rodriguezii, Satureja cordata subsp. rodriguezii, Satureja cypria, Satureja graeca var. pauciflora, Satureja microphylla, Satureja microphylla subsp. rodriguezii, Satureja rodriguezii, Satureja teneriffae, Thymus microphyllus

oblasti: J Itálie, JV Evropa, JZ Evropa, Kréta, Kypr, Sicílie, Z Asie

Roste na jihu Itálie, Sicílii a Krétě v podobě keře. Dorůstá výšky (5 -) 10 - 30cm. Povrch je mírně ochlupený. Větve jsou nitkovité, poléhavé nebo vystoupavé a větvené. Listy jsou 3úhle vejčité až eliptické, špičaté, celokrajné, dlouhé 3 - 6mm, široké 2 - 4mm a báze je prakticky přisedlá.

Květenstvím je 1 - 6tičetných lichopřeslen, vlastní květy jsou stopkaté, kalich má délku 2,5 - 3,5mm, koruna růžovofialová a dlouhá 5 - 8mm.

Vyhovují mu skalní pukliny, plné slunce, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Micromeria monantha

synonyma: Satureja monantha

Micromeria myrtifolia

synonyma: M. juliana var. myrtifolia, M. lycia, M. minoa, M. obtusiflora, Satureja myrtifolia

oblasti: Írán, Izrael, JV Evropa

Roste v jihovýchodní Evropě a západní Asii v podobě keře. Dorůstá výšky 10 - 40cm. Povrch je ochlupený. Listy jsou u báze vejčité, vyšší úzce kopinaté, tupé, celokrajné, na okraji ohrnuté a dlouhé 3 - 8mm. Květenstvím je 4 - 20tičetný přeslen, vlastní květy jsou růžovofialové a dlouhé 5mm.

Vyhovují mu skalní pukliny, plné slunce, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Micromeria nervosa (Saturejka žilnatá)

synonyma: Clinopodium nervosum, M. hirsuta, M. nervosa var. plumosa, M. plumosa, Satureja capitata, Satureja filiformis, Satureja graeca subsp. nervosa, Satureja nervosa, Satureja plumosa

oblasti: Itálie, Izrael, JV Evropa, JZ Evropa, S Afrika, Středozemí

Roste ve středozemí v podobě keře. Dorůstá výšky 10 - 40 (i 50)cm. Povrch je ochlupený. Větve jsou bohaté, vzpřímené nebo vystoupavé, prakticky nevětvené a ochlupené. Listy jsou vejčité, špičaté, dlouhé 0,7 - 1cm, široké 4 - 5mm a řapíky jsou velmi krátké. Květenstvím jsou do hlávky seskupené 4 - 20tičetné lichopřesleny, vlastní květy jsou stopkaté, kalich má délku 3 - 4mm, koruna je růžovofialová a dlouhá 4 - 6mm.

Vyhovují mu skalní pukliny, plné slunce, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Micromeria peltieri

synonyma: Satureja peltieri

Micromeria persica

synonyma: Satureja persica

oblasti: Irák, Írán, Malá Asie (Anatolie)

Roste v Iráku, Íránu a Turecku. Povrch je ochlupený. Listy jsou vejčité (horní čárkovité), tupé, na okraji ohrnuté a přisedlé. Květenstvím je 3 - 5tičetný úžlabní klasovitý vrcholík.

Micromeria pineolens

synonyma: Satureja pineolens

oblasti: Makaronésie

Patří mezi endemity Gran Canaria v podobě keře. Dorůstá výšky 15 - 75cm. Kmínek je vzpřímený a větvený. Listy jsou dlouze vejčité, ochlupené, podvinuté a dlouhé do 2cm. Květy jsou růžové a dlouhé do 1,5cm.

Micromeria piperella

synonyma: M. marginata, Thymus marginatus, Thymus piperella

oblasti: Alpy, Středozemí

Roste ve středozemí a Alpách v podobě polokeře. Dorůstá výšky 8 - 10 (i 20)cm. Stonky jsou vzpřímené a ochlupené. Listy jsou vejčité, celokrajné, tupé, dlouhé (0,3 -) 0,6 - 1,2cm, široké 3 - 5mm, báze kulatá až mírně srdčitá, spodní strana řídce ochlupená. Květenstvím je 2 - 12tičetný řídký lichopřeslen, vlastní květy jsou stopkaté, kalich je ochlupený, dlouhý 6 - 8mm, koruna je růžovofialová až fialová a dlouhá 1,2 - 1,6cm.

Micromeria pseudocroatica

synonyma: Satureja pseudocroatica

Micromeria remota

oblasti: Sokotra

Roste na Sokotře v podobě plazivého až poléhavého polokeře. Dorůstá výšky do 15cm. Listy jsou vstřícné, vejčité, podvinuté, na bázi kulaté až srdčité. Květenstvím je terminální lichopřeslen, má listeny, kalich je trubkovitý, koruna 2pyská, horní pysk 2laločný, spodní 3laločný, růžová a dlouhá 7mm.

Vyhovuje mu vysoká vzdušná vlhkost a žulový kamenitý substrát.

Micromeria rivas-martinezii

synonyma: M. rivas-martinezii f. angustifolia, Satureja rivas-martinezii

Micromeria serbaliana

synonyma: Satureja serbaliana

Micromeria sinaica

synonyma: Clinopodium sinaicum, Satureja sinaica

oblasti: Izrael, Sinajský poloostrov

Roste na Sinajském poloostrově a Izraeli. Povrch je ochlupený. Listy jsou malé, řídké, vejčité, okraje svinuté, podlouhlé a prakticky přisedlé. Květenstvím je bohatý prakticky přisedlý přeslen ze kterých je vytvořený klas.

Micromeria sphaciotica

synonyma: M. carpatha, Satureja sphaciotica

Micromeria sphaerophylla

synonyma: Satureja sphaerophylla

Micromeria suborbicularis

synonyma: Satureja suborbicularis

Micromeria teneriffae

synonyma: Clinopodium therebinthinaceum, M. teneriffae f. ramosa, M. teneriffae var. ramosa, M. therebinthinacea, Satureja teneriffae, Thymus teneriffae, Thymus therebinthinaceus

Micromeria tenuis

synonyma: M. polioides, Satureja polioides, Satureja tenuis

Micromeria tragothymus

Micromeria unguentaria

synonyma: M. longiflora, Satureja unguentaria

Micromeria varia

synonyma: Clinopodium ericifolium, M. ericifolia, M. thymoides var. citriodora, M. varia var. citriodora, Satureja ericifolia, Satureja varia, Thymus ericifolius, Thymus floribundus, Thymus inodarus

oblasti: Makaronésie

Je arometický. Lodyhy poléhavé až vystoupavé, větvené, 4hranné. Listy celokrajné, kopinaté, podvinuté, mohou být ochlupené a dlouhé do 1,5cm. Květenstvím je terminální lichoklas, vlastní květy 2pyské, růžové až fialové s průměrem do 6mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. cacuminicolae - endemit Madeiry; polokeř; výška do 20cm
- var. thymoides - endemit Madeiry; polokeř; výška do 35cm;

Vyskytuje se ve skalních puklinách.

Micromeria wardii

oblasti: Xizang (Tibet)

Roste v Číně v podobě aromatického polokeře. Dorůstá výšky do 50cm. Větve jsou v mládí narůžovofialovělé. Listy jsou vejčité, celokrajné, tupé, dlouhé 1 - 1,5cm, široké 4 - 7mm, báze je klínovitá a řapíky jsou dlouhé 1mm. Květenstvím je 2 - 6tičetný lichopřeslen, listence jsou šídlovité, dlouhé 1 - 3mm, kalich je narůžovofialovělý, dlouhý 4 - 5mm, široký 1 - 1,5mm, koruna je narůžovofialovělá, dlouhá 1,4cm a horní pysk je 2laločný.

Micromeria weilleri

synonyma: Satureja weilleri

Micromeria x angosturae

synonyma: Satureja x angosturae

Micromeria x benthamineolens

synonyma: Satureja x benthamineolens

Micromeria x bourlieri

synonyma: Satureja x bourlieri

Micromeria x confusa

synonyma: Satureja x confusa

Micromeria x hybrida

synonyma: M. x tapeinantha

Micromeria x intermedia

synonyma: Satureja x benthamifolia

Micromeria x meteorica

Micromeria x nogalesii

synonyma: Satureja x nogalesii

Micromeria x perez-pazii

synonyma: Satureja x perez-pazii

Micromeria x preauxii

synonyma: Satureja x preauxii

Micromeria x tagananensis

synonyma: *Satureja x tagananensis*

Micromeria x wildpretii

synonyma: *Satureja x wildpretii*

Další informace:

<http://botany.cz/cs/micromeria-pineolens/>

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=476>

<http://www.kadel.cz/skalnicky/t/kvResult.asp?Rod=Micromeria.htm>

<https://www.rostliny.net/>