

Micromeria graeca (Mikromerie řecká)

synonyma: Clinopodium graecum, Micromeria calaminthoides, Micromeria calaminthoides var. contracta, Micromeria calaminthoides var. elongata, Micromeria canescens, Micromeria cosentina, Micromeria diffusa, Micromeria echioides, Micromeria echioides var. angustifolia, Micromeria echioides var. gossypina, Micromeria echioides var. griseocanescens, Micromeria echioides var. humillima, Micromeria echioides var. strigosa, M. subsp. micrantha, M. var. angustifolia-canescens, M. var. latifolia, M. var. rariflora, M. var. rupestris, Micromeria grandis, Micromeria grandis var. humilior, Micromeria lacaitae, Satureja canescens, Satureja congesta, Satureja gorganica, Satureja graeca, Satureja graeca subsp. congesta, Satureja graeca subsp. macrotricha, Satureja graeca subsp. micrantha, Satureja graeca var. canescens, Satureja graeca var. congesta, Satureja graeca var. leptiloba, Satureja graeca var. micrantha, Satureja micrantha, Satureja sessiliflora, Satureja sicula var. canescens, Thymus hirtus, Thymus micranthus, Thymus virgatus

čeleď: Lamiaceae

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Baleáry, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Černá Hora, Francie, J Itálie, JV Evropa, Katalánsko, Korsika, Kosovo, Kréta, Libanon, Makedonie, Maroko, Portugalsko, Řecko, S Itálie, Sardínie, Sicílie, Slovensko, Srbsko, Střední Itálie, Sýrie, Tunisko, Turecko

Roste ve středozemí v podobě polokeře. Dorůstá výšky 10 - 30 (i 60)cm. Povrch je plstnatý. Stonky jsou vystoupavé a větvené. Listy jsou střídavé, vejčité až úzce kopinaté, podvinuté, dlouhé 0,7 - 1,2 (i 1,4)cm a široké 1 - 7mm. Květenství tvoří 2 - 18tičetný lichopřeslen objevující se v paždí listů, vlastní květy mají nálevkovitý kalich délky (2 -) 3 - 5 (i 6)mm, koruna je bledě růžovofialová a dlouhá (0,5 -) 0,6 - 0,8 (i 1,3)cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. consentina/Satureja consentina - jižní Itálie, Sicílie; povrch lepkavě ochlupený; řídký 2 - 6tičetný lichopřeslen, korunní trubka dlouhá 5 - 6mm, kvete na podzim
- subsp. fruticulosa/Thymus fruticosus - jižní Itálie, Albánie, Jugoslávie, Sardínie, Sicílie; povrch ochlupený; 1 - 4četný lichopřeslen, korunní trubka dlouhá 4 - 6mm, kvete na jaře
- subsp. gorganica/Satureja gracea subsp. gorganica - jihovýchod Itálie; řídké min. 4četné lichopřesleny, korunní trubka dlouhá 4 - 6mm, kvete na jaře
- subsp. graeca - povrch ochlupený; lichopřeslen 14 - 18tičetný, kvete na jaře
- subsp. imperica/M. thymoides - severozápadní Itálie; větve nitkovité, listy čárkovité
- subsp. longiflora - střední a jižní Itálie, Sicílie; povrch srstnatý; horní listy trochu širší; lichopřesleny hustejší
- subsp. tenuifolia - Itálie, Sardínie, Sicílie; krátce ochlupené; lichopřesleny 2 - 4četné, květy přisedlé, korunní trubka dlouhá 2 - 3mm, kvete na jaře

Vyhovují mu skalní pukliny, plné slunce, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.
