

Sideroxylon (Železovec)

synonyma: Apterygia, Bumelia, Calvaria, Cryptogyne, Decateles, Dipholis, Edgeworthia, Lyciodes, Mastichodendron, Monothea, Nesoluma, Reptonia, Robertia, Robertsia, Rostellaria, Sclerocladus, Sinosideroxylon, Spiniluma, Spondogona, Tatina

čeleď: Sapotaceae

Roste v tropech v podobě beztrnného stromu nebo keře. Dřevo je velmi tvrdé. Listy jsou střídavé, kožovité a řapíky jsou tenké. Kvete drobnými žlutozelenými nebo bílými květy ve svazečcích, kališní lístky bývají tupé, koruna prakticky kolovitá. Plodem je vejčitá až kulovitá bobule obsahující zpravidla 1 semeno.

Sideroxylon acunae

synonyma: Bumelia acunae, Bumelia revoluta, S. angustum

oblasti: Kuba

Roste na Kubě.

Sideroxylon alachense

synonyma: Bumelia anomala, Bumelia lanuginosa var. anomala, Bumelia tenax f. anomala

oblasti: Florida, Georgia

Roste v USA v podobě opadavého stromu. Dorůstá výšky do 10m. Listy jsou dlouhé do 7cm, spodní strana je tmavě zelená a horní jasně zelená. Květenství je až 20tičetné, vlastní květy bílé. Plodem je černá bobule o průměru do 1,3cm.

Sideroxylon altamiranoi

synonyma: Bumelia altamiranoi

oblasti: Hidalgo, Querétaro

Roste v Mexiku.

Sideroxylon americanum

synonyma: Achras retusa, Bumelia americana, Bumelia americana subsp. neglecta, Bumelia bahamensis, Bumelia excisa, Bumelia loranthifolia, Bumelia navassana, Bumelia neglecta, Bumelia oblongata, Bumelia retusa, Bumelia retusa subsp. neglecta, Bumelia retusa var. loranthifolia, Bumelia roigii, Lyciodes retusum, Maurocena americana

oblasti: Karibik, Yucatán

Roste na Yukatánu a v karibiku.

Sideroxylon anomalum

synonyma: *Bumelia integra*, *Dipholis anomala*

oblasti: Dominikánská Republika

Roste v Dominikánské Republice.

Sideroxylon beguei

synonyma: *S. beguei* var. *longipedicellata*, *S. beguei* var. *saboureaui*

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Sideroxylon bequaertii

oblasti: Demokratická Republika Kongo (Zair)

Roste v Zairu.

Sideroxylon betsimisarakum

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Sideroxylon borbonicum

synonyma: *Calvaria borbonica*, *Mastichodendron borbonicum*, *S. floribundum*, *S. pedicellatum*, *S. spurium*

Roste na Réunionu v podobě stálezeleného stromu. Dorůstá výšky 5 - 15 (i 20)cm při průměru kmene až 1m. Při poranění roní latex. Listy jsou střídavé, umístěné na koncích větví, kožovité, eliptické, celokrajné, zaoblené až mírně vykrojené s výraznou centrální žlutozelenou žilkou. Květenství je svazčité, objevuje se na starších větvích, vlastní květ má délku 5mm, kalich je 4 - 5tičetný a koruna je zvonkovitá. Plodem je krátce stopkatá obvejčitá bobule délky 1 - 1,5cm v barvě tmavěčervené. Obsahuje 1 semeno.

Vyhovují mu zalesněná vlhká místa s vyšší vzdušnou vlhkostí a půda bohatá na živiny.

Sideroxylon boutonianum

synonyma: *Calvaria boutoniana*, *S. corsanii*

Roste na Mauriciusi.

Sideroxylon bullatum

synonyma: *Bumelia bullata*, *Dipholis bullata*

oblasti: Jamajka

Roste na Jamajce.

Sideroxylon canariense

oblasti: Makaronésie

Roste na Kanárských ostrovech.

Sideroxylon cantoniense

oblasti: JV Čína

Roste v Číně.

Sideroxylon capiri

synonyma: *Achras capiri*, *Lucuma capiri*, *Mastichodendron capiri*, *Paralabatia capiri*, *S. petiolare*

oblasti: Karibik

Roste ve střední Americe včetně karibiku.

Sideroxylon capuronii

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Sideroxylon cartilagineum

synonyma: *Bumelia cartilaginea*

oblasti: Guerrero, Jalisco, Sinaloa

Roste v Mexiku.

Sideroxylon celastrinum

synonyma: *Bumelia affinis*, *Bumelia angustifolia*, *Bumelia celastrina*, *Bumelia celastrina* var. *angustifolia*, *Bumelia eggersii*, *Bumelia ferox*, *Bumelia hayesii*, *Bumelia megacocca*, *Bumelia parvifolia*, *Bumelia reclinata*, *Bumelia schottii*, *Bumelia spiniflora*, *Bumelia spinosa*, *Lyciodes angustifolium*, *Lyciodes candolleanum*, *Lyciodes ferox*, *Lyciodes hayesii*, *Lyciodes spiniflorum*

oblasti: Florida, Kolumbie, Kuba, Texas, Venezuela

Roste od jihu USA po Kolumbii a Venezuelu v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 2 - 9m. Listy jsou tmavězelené, střídavé, obkopinaté až obvejčité. Květy jsou žlutobílé. Plodem je modročerná bobule s 1 semenem.

Sideroxylon cinereum

synonyma: Calvaria bojeriana, Mastichodendron bojerianum, S. bojerianum

Roste na Mauriciusi.

Sideroxylon contrerasii

synonyma: Bumelia contrerasii, Dipholis contrerasii, Pouteria odorata

oblasti: Guatemala, Kostarika, Mexiko, Panama

Roste ve střední Americe.

Sideroxylon cubense

synonyma: Apterygia conferta, Bumelia conferta, Bumelia cubensis, Bumelia cubensis var. oblongata, Bumelia gymnanthifolia, Bumelia neglecta, Dipholis angustifolia, Dipholis cubensis, Dipholis cubensis var. oblongata, Dipholis domingensis, Dipholis leptopoda, Dipholis sintenisiana, S. confertum

oblasti: Kuba, Portoriko

Roste v karibiku.

Sideroxylon discolor

synonyma: Spiniluma discolor

oblasti: Sokotra

Roste na Sokotře.

Sideroxylon dominicanum

synonyma: Bumelia dominicana, Bumelia ferruginea, Dipholis ferruginea

oblasti: Dominikánská Republika

Roste v Dominikánské Republice.

Sideroxylon durifolium

synonyma: Bumelia durifolia, Dipholis durifolia

oblasti: Belize, Chiapas

Roste v Belize a Mexiku.

Sideroxylon ekmanianum

synonyma: Bumelia cubensis subsp. ekmaniana, Bumelia ekmaniana, Dipholis ekmaniana

oblasti: Kuba

Roste na Kubě.

Sideroxylon eriocarpum

synonyma: Bumelia eriocarpa

oblasti: Oaxaca

Roste v Mexiku.

Sideroxylon eucoriaceum

synonyma: Bumelia eucoriacea, Mastichodendron eucoriaceum

oblasti: Guatemala, Veracruz

Roste v Mexiku a Guatemale.

Sideroxylon eucuneifolium

synonyma: Bumelia eucuneifolia, Mastichodendron eucuneifolium

oblasti: Guatemala

Roste v Guatemale.

Sideroxylon excavatum

oblasti: Guerrero, Oaxaca

Roste v Mexiku.

Sideroxylon fimbriatum

synonyma: Calvaria fimbriata, Mastichodendron fimbriatum

oblasti: Sokotra

Roste na Sokotře.

Sideroxylon floribundum

synonyma: Mastichodendron floribundum

oblasti: Belize, Guatemala, Jamajka

Roste v Belize, Guatemale a Jamajce.

Sideroxylon foetidissimum

synonyma: *Achras pallida*, *Bumelia auzuba*, *Bumelia foetidissima*, *Bumelia lucida*, *Bumelia mastichodendrum*, *Bumelia pallida*, *Bumelia pauciflora*, *Mastichodendron foetidissimum*, *Mastichodendron foetidissimum* var. *cuneatum*, *Mastichodendron sloaneanum*, *S. acouma*, *S. domingense*, *S. foetidissimum* var. *quadriloculare*, *S. jamaicense*, *S. lucidum*, *S. mastichodendron*, *S. mastichodendron* var. *pallidum*, *S. nitidum*, *S. obovatum*, *S. oppositifolium*, *S. pallidum*, *S. pallidum* var. *sphaerocarpum*, *S. pauciflorum*, *S. quadriloculare*

oblasti: Belize, Florida, Guatemala, Portoriko, S Mexiko

Roste na Floridě, střeně Americe a Karibiku.

Sideroxylon galeatum

synonyma: *Calvaria galeata*

Roste na ostrově Rodrigues.

Sideroxylon gerrardianum

synonyma: *Calvaria gerrardiana*, *Cryptogyne gerrardiana*, *S. gerrardianum*

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Sideroxylon grandiflorum

synonyma: *Calvaria grandiflora*, *Sapota lessertii*, *S. annithomae*, *S. lessertii*

Sideroxylon hirtiantherum

synonyma: *Bumelia parviflora*, *Mastichodendron parviflorum*

oblasti: Guatemala, Honduras

Roste v Guatemale a Hondurasu.

Sideroxylon horridum

synonyma: *Bumelia glomerata*, *Bumelia glomerata* subsp. *horrida*, *Bumelia glomerata* subsp. *microphylla*, *Bumelia horrida*, *Bumelia microphylla*, *Bumelia pachyclada*, *Bumelia tortuosa*

oblasti: Kuba

Roste na Kubě a Kajmanských ostrovech.

Sideroxylon ibarrae

synonyma: *Bumelia ibarrae*

oblasti: Guatemala

Roste v Guatemale.

Sideroxylon inerme

synonyma: *Calvaria inermis*, *S. atrovirens*, *S. inerme* var. *schlechteri*

oblasti: Indie, Jihoafrická Republika (JAR), Keňa, Mosambik, Pákistán, Somálsko, Svazijsko, Tanzánie, Zimbabwe

Roste v jižní a východní Africe, ale i Indii a Pákistánu v podobě stálezeleného keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 10 (i 15)m. Borka je šedohnědá až černá, popraskaná a v mládí šedě ochlupená. Listy jsou jednoduché, spirálovité, eliptické či obvejčité, kožovité, tmavězelené, lesklé, dlouhé 4 - 12cm, široké 2 - 5cm, spodní strana světlejší a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 2cm. Květy jsou oboupohlavné, zelené až bílé, dlouhé do 4mm, 5tičetné, samostatné nebo seskupené do několikačetných skupin a jsou vonné. Plodem je zaokrouhlená bobule průměru do 1,2cm s krátkou stopkou a růžovofialovou až černou barvou. Obsahuje 1 semeno průměru 5 - 9mm. Při poranění roní bílý latex. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *cryptophlebium* - endemit ostrova Aldabra na Seychelských ostrovech
- subsp. *diospyroides*/*S. diospyroides* - Somálsko, Keňa, Tanzánie, Zimbabwe, Mosambik; výška 1 - 15m; borka šedá, rozpraskaná; listy obvejčité, tupé nebo vykrojené, dlouhé 4 - 12cm, široké 2 - 6,5cm, holé, báze klínovitá; květy zelenobílé, svazčité, koruna délky do 4mm; plody růžovofialové až černé, kulovité, průměru 0,5 - 1,5cm
- subsp. *inerme* - Mosambik a JAR

Vyskytuje se při pobřeží na vlhkých chráněných místech

Sideroxylon jubilla

synonyma: *Bumelia jubilla*, *Dipholis jubilla*

oblasti: Kuba

Roste na Kubě.

Sideroxylon lanuginosum

synonyma: *Bumelia arachnoidea*, *Bumelia arborea*, *Bumelia ferruginea*, *Bumelia lanuginosa*, *Bumelia lanuginosa* subsp. *albicans*, *Bumelia lanuginosa* var. *albicans*, *Bumelia pauciflora*, *Bumelia rufa*, *Bumelia tomentosa*, *Chrysophyllum ludovicianum*, *Lyciodes lanuginosum*, *S. lanuginosum* subsp. *albicans*, *Tatina parviflora*

oblasti: Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Illinois, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Nové Mexiko, Oklahoma, SV Mexiko, Texas

Roste v USA a Mexiku. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *albicans*
- subsp. *lanuginosum*
- subsp. *oblongifolium*
- subsp. *rigidum*

Sideroxylon leucophyllum

synonyma: *Pouteria leucophylla*

oblasti: Kalifornský záliv, Sonora

Roste v Mexiku.

Sideroxylon lycioides

synonyma: *Bumelia ambigua*, *Bumelia lucida*, *Bumelia lycioides*, *Bumelia lycioides* var. *ellipsoidalis*, *Bumelia lycioides* var. *virginiana*, *Bumelia pubescens*, *Bumelia smallii*, *Decateles latifolia*, *Decateles lycioides*, *Lyciodes spinosum*, *Robertia decandra*, *S. decandrum*, *S. decumbens*, *S. laeve*, *S. lyciifolium*

oblasti: Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Missouri, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Západní Virginie

Roste v USA.

Sideroxylon macrocarpum

synonyma: *Bumelia lanuginosa* var. *macrocarpa*, *Bumelia macrocarpa*

oblasti: Georgia

Roste v USA.

Sideroxylon majus

synonyma: *Calvaria imbricarioides*, *Calvaria major*, *S. imbricarioides*, *S. laurifolium*

Roste na Réunionu.

Sideroxylon marginatum

synonyma: *Calvaria marginata*, *Sapota marginata*, *S. mirmulano* var. *edulis*, *S. mirmulano* var. *marginata*

oblasti: Makaronésie

Roste na Kapverdských ostrovech v podobě stálezeleného stromu. Dorůstá výšky 1 - 5 (i 12)m. Borka je červenohnědá až šedá. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou střídavé, mírně obvejčité, podvinuté, tmavězelené, holé, dlouhé (4 -) 5 - 10,5 (i 15)cm, široké (3 -) 3,5 - 6,5 (i 9)cm, v mládí ochlupené, spodní strana bledší a řapíky jsou dlouhé 0,7 - 1,8 (i 3)mm. Květenství je svazčité, 5tičetné, kališní lístky má dlouhé 2 - 4,5mm, korunní lístky jsou u báze srostlé, dlouhé 4 - 5mm, červené nebo bělavé. Plody jsou eliptické, dlouhé 0,7 - 1,5cm a mají červenohnědou barvu.

Vyhovují mu skalnatá místa.

Sideroxylon marmulano

oblasti: Makaronésie

Roste na Kanárských ostrovech v podobě stálezeleného keře. Dorůstá výšky do 2,5m. Větve jsou v mládí rezavě ochlupené. Listy jsou střídavé, jednoduché, obvejčité až eliptické, zakulacené, kožovité, tmavězelené, lesklé, holé, dlouhé 4 - 15cm, široké 2,5 - 6,5cm, žilnatina je síťovitá a mají řapíky. Květenství tvoří 1 - 7mičetný svazek, vlastní květy mají 0,4 - 1,5cm rezavě ochlupené stopky a koruna je narůžovělá. Plodem je obvejčitá červená až černá lesklá bobule délky 1,4 - 1,8cm a průměru 1,1 - 1,2cm. Semeno je obvejčité.

Sideroxylon mascatense

synonyma: Edgeworthia buxifolia, Monotheca buxifolia, Monotheca mascatensis, Reptonia buxifolia, Reptonia mascatensis, S. aubertii, S. buxifolium, S. corradii, S. gillettii, Spiniluma buxifolia

oblasti: Etiopie, Pákistán

Roste od Etiopie po Pákistán v podobě malého stromu nebo velkého trnitého keře. Listy vyrůstají v přeslenech nebo střídavě, jsou zakulacené, podvinuté, dlouhé 2,5 - 3,5cm, široké 1 - 1,5cm a řapíky jsou dlouhé 2 - 3mm. Květy mají 1mm stopku, průměr 5mm, kalich má špičaté laloky délky 3mm, koruna má laloky délky 2mm a šířky 1mm. Plody mají průměr méně než 1cm.

Sideroxylon mermulana

Sideroxylon mirmulans

synonyma: Calvaria mirmulano, S. marmulana, S. marmulano, S. mirmulano

oblasti: Makaronésie

Roste na Madeiře.

Sideroxylon moaense

synonyma: Bumelia moaensis

oblasti: Kuba

Roste na Kubě.

Sideroxylon montanum

synonyma: Achras montana, Bumelia montana, Dipholis lanceolata, Dipholis montana, Dipholis pallens

oblasti: Jamajka

Roste na Jamajce.

Sideroxylon nadeaudii

synonyma: Nesoluma nadeaudii, Palaquium nadeaudii

oblasti: Tichý oceán

Roste na Tahiti.

Sideroxylon nervosum

oblasti: Myanmar (Barma)

Roste v Myanmaru.

Sideroxylon obovatum

synonyma: *Achras cuneifolia*, *Bumelia buchii*, *Bumelia cuneata*, *Bumelia heterophylla*, *Bumelia krugii*, *Bumelia lineolata*, *Bumelia myrsinifolia*, *Bumelia obovata*, *Bumelia obovata* var. *krugii*, *Bumelia obovata* var. *portoricensis*, *Bumelia obovata* var. *thomensis*, *Bumelia parvifolia*, *Bumelia subintegra*, *Lyciodes myrsinifolium*, *Lyciodes obovatum*, *Lyciodes parvifolium*, *S. cuneatum*

oblasti: Portoriko, Venezuela

Roste v Karibiku a Venezuele.

Sideroxylon obtusifolium

synonyma: *Apterygia sartorum*, *Bumelia excelsa*, *Bumelia fragrans*, *Bumelia obtusifolia*, *Bumelia obtusifolia* subsp. *excelsa*, *Bumelia obtusifolia* subsp. *typica*, *Bumelia obtusifolia* var. *excelsa*, *Bumelia obtusifolia* var. *reflexa*, *Bumelia rhamnoides*, *Bumelia rotundifolia*, *Bumelia sartorum*, *Bumelia sartorum*, *Bumelia sartorum* var. *latifolia*, *Lyciodes obtusifolium*, *Lyciodes sartorum*, *S. pacurero*

oblasti: Paraguay, Střední Amerika, Veracruz

Roste od Mexika po Paraguay.

Sideroxylon occidentale

synonyma: *Bumelia brandegeei*, *Bumelia cuneifolia*, *Bumelia fragrans*, *Bumelia occidentalis*, *Lyciodes occidentale*

oblasti: Kalifornský záliv, Sonora

Roste v Mexiku.

Sideroxylon octosepalum

synonyma: *Bumelia octosepala*, *Dipholis octosepala*

oblasti: Jamajka

Roste na Jamajce.

Sideroxylon oxyacanthum

synonyma: Mastichodendron oxyacantha, Spiniluma oxyacantha

oblasti: Eritrea, Etiopie, Saudská Arábie

Roste v Etiopii, Eritrei a Saudské Arábii.

Sideroxylon palmeri

synonyma: Achras olivacea, Bumelia laetevirens, Bumelia mexicana, Bumelia palmeri, Lyciodes laetevirens

oblasti: Mexiko

Roste v Mexiku.

Sideroxylon peninsulare

synonyma: Bumelia peninsularis

oblasti: Kalifornský záliv

Roste v Mexiku.

Sideroxylon persimile

synonyma: Bumelia austin-smithii, Bumelia barba-tigris, Bumelia eloxochitlensis, Bumelia grisebachii, Bumelia guatemalensis, Bumelia lankesteri, Bumelia leiogyna, Bumelia megaphylla, Bumelia panamensis, Bumelia persimilis, Bumelia pleistochasia, Lyciodes persimile

oblasti: Karibik, Kolumbie, Venezuela

Roste ve střední Americe, Kolumbii, Venezuele a Trinidadu.

Sideroxylon picardae

synonyma: Bumelia picardae

oblasti: Hispaniola

Roste na Hispaniole.

Sideroxylon polynesicum

synonyma: Chrysophyllum polynesicum, Isonandra polynesica, Nesoluma polynesicum

oblasti: Havajské ostrovy

Roste na Havajských ostrovech.

Sideroxylon portoricense

synonyma: Achras nigra, Bumelia bellonis, Bumelia nigra, Dipholis bellonis, Dipholis nigra, Dipholis

nigra var. brachyphylla, Mastichodendron portoricense

oblasti: Portoriko

Roste na Velkých Antilách.

Sideroxylon puberulum

synonyma: Planchonella puberula, S. bojerianum var. puberulum, S. cinereum var. puberulum

Roste na Mauriciusi.

Sideroxylon radianum

Sideroxylon reclinatum

synonyma: Bumelia lycioides var. reclinata, Bumelia microcarpa, Bumelia reclinata

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Louisiana, Mississippi

Roste v USA. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. autrofloridense
- subsp. reclinatum
- subsp. rofotomentosum

Sideroxylon repens

synonyma: Bumelia repens, Dipholis repens

oblasti: Hispaniola

Roste na Hispaniole.

Sideroxylon retinerve

synonyma: Bumelia hondurensis

oblasti: Honduras

Roste v Hondurasu.

Sideroxylon rotundifolium

synonyma: Achras rotundifolia, Bumelia clarendonensis, Bumelia obtusifolia, Bumelia peckhamensis, Bumelia purdiaei, Bumelia rotundifolia, Lyciodes rotundifolium

oblasti: Jamajka

Roste na Jamajce.

Sideroxylon rubiginosum

synonyma: Bumelia sericea, Dipholis sericea

oblasti: Dominikánská Republika

Roste v Dominikánské Republice.

Sideroxylon salicifolium

synonyma: Achras pentagona, Achras salicifolia, Bumelia lenticellata, Bumelia pentagona, Bumelia salicifolia, Bumelia undulata, Dipholis lenticellata, Dipholis salicifolia, Dipholis salicifolia var. jamaicensis, S. nigrum, S. pauciflorum, S. pentagonum, Spondogona nitida, Spondogona salicifolia

oblasti: Florida, Portoriko

Roste na Floridě, střední Americe a Karibiku.

Sideroxylon saxorum

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Sideroxylon sessiliflorum

synonyma: Achras sessiliflora, Calvaria hexangularis, S. longifolium, S. parviflorum

Roste na Mauriciusi.

Sideroxylon socorrense

synonyma: Bumelia socorrensis

oblasti: Z Mexiko

Roste na ostrovech Revillagigedo patřícím Mexiku.

Sideroxylon st-johnianum

synonyma: Nesoluma st-johnianum

oblasti: Tichý oceán

Sideroxylon stenospermum

synonyma: Bumelia stenosperma

oblasti: Střední Amerika

Roste ve střední Americe.

Sideroxylon stevensonii

synonyma: Bumelia stevensonii, Dipholis stevensonii, S. rufotomentosum

oblasti: Belize, Chiapas, Guatemala

Roste v Mexiku, Belize a Guatemale. Při poranění roní latex, který místní obyvatelé využívají jako náhradu gumy.

Sideroxylon tambolokoko

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Sideroxylon tenax

synonyma: Bumelia chrysophylloides, Bumelia lacuum, Bumelia tenax, Chrysophyllum carolinense, Chrysophyllum glabrum, Lyciodes tenax, Sclerocladus tenax, Sclerозus tenax, S. carolinense, S. chrysophylloides, S. sericeum

oblasti: Florida, Georgia, Jižní Karolína, Severní Karolína

Roste v USA v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 8m. Listy jsou zelené, dlouhé do 7cm a spodní strana je hnědě ochlupená. Květy jsou bílé, v průměru mají až 5cm a jsou seskupené v až 40tičetném květenství. Plodem je téměř černá vejčitá bobule průměru 1cm.

Sideroxylon tepicense

synonyma: Chrysophyllum tepicense, Mastichodendron angustifolium, S. angustifolium, S. mexicanum

oblasti: Střední Amerika

Roste ve střední Americe.

Sideroxylon thornei

synonyma: Bumelia thornei

oblasti: Alabama, Florida, Georgia

Roste v USA.

Sideroxylon verruculosum

synonyma: Bumelia verruculosa

oblasti: Veracruz

Roste v Mexiku.

Sideroxylon wightianum

synonyma: *Bumelia harmandii*, *Mastichodendron wightianum*, *S. harmandii*, *S. wightianum* var. *balansae*, *S. wightianum* var. *tonkinense*, *Sinosideroxylon wightianum*

oblasti: Guangdong, Guizhou, Vietnam, Yunnan

Roste v Číně a Vietnamu.

Další informace:

<http://botany.cz/cs/sideroxylon-marginatum/>

<http://database.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=3070>

<https://www.rostliny.net/>