

Brachyglottis

čeleď: Asteraceae

Rodové jméno pochází z řeckého brachus = krátký a glottis = jazyk. Roste zejména na Novém Zélandě a Tasmánii v podobě stálezeleného keře až nízkého stromu, ale i popínavé rostliny či byliny. Listy jsou střídavé, laločnaté nebo mělce zubaté. Kvete žlutými květy v úboru, které mohou vytvářet latu či hrozen. Plodem je nažka. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Dunedin Hybrids' - kříženec *B. compacta*, *B. greyi* a *B. laxifolia*; výška do 1,5m; nepravidelný habitus, povrch v mládí bíle plstnatý; listy obvejčité až vejčité, tupé, celokrané až vykrajované, šedé, tmavězelené, dlouhé 3 - 7cm, na spodní straně bíle plstnaté; květenstvím je žlutý úbor o průměru do 2,5cm který je seskupený v terminální latě
- 'Leonard Cockayne' - kříženec *B. greyi* a *B. rotundifolia*; široce rozkladitý; listy šedozelené, zvlněné, dlouhé do 15cm a na spodní straně bílé; květenstvím je lata složená z úborů
- 'Moira Red' - listy mají béžovožluté skvrny
- 'Silver Dormouse'
- 'Sunshine' - výška 1m nebo více, šířka min. 2x tolik; listy zelené, v mládí štříbřitěšedé; květenstvím je žlutý úbor seskupený do chocholíku

Vyhovuje mu plné slunce nebo polostín a dobře propustná půda. Není zpravidla mrazuvzdorný.

Množí se semeny nebo řízků.

Brachyglottis adamsii

synonyma: *Senecio adamsii*, *Senecio pachyphyllus*

oblasti: Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v podobě keře. Dorůstá výšky 1m. Listy jsou husté, eliptické, celokrajné, tlusté, svrasklé, dlouhé 2,5 - 5cm a na spodní straně bíle plstnaté. Kvete v úborech.

Brachyglottis arborescens

synonyma: *B. repanda* var. *arborescens*

oblasti: Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě.

Brachyglottis bellidioides

synonyma: *Senecio bellidioides*

oblasti: Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě. Listy jsou přízemní, prakticky okrouhlé, tupé a ochlupené. Stonky jsou plstnaté. Kvete žlutými květy v samostatných úborech o průměru 2 - 3cm a zákrov je také plstnatý.

Brachyglottis bidwillii

synonyma: *Senecio bidwillii*

oblasti: Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v podobě stálezeleného keře. Dorůstá výšky 0,3 - 1 (i 2)m. Větve jsou bíle ochlupené. Listy jsou mírně vejčité, tlusté, lesklé, kožovité, na spodní straně ochlupené a dlouhé 1 - 2,5 (i 5)cm. Kvete bílými květy v úborech o průměru 0,6 - 0,8 (i 1,5)cm seskupených do lat o velikosti 5cm. Plodem je nažka délky do 8mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *viridis* - listy větší a tenčí

Vyhovuje mu středně úrodná a vlhká dobře propustná půda v polostínu.

Množí se semeny nebo řízků.

Brachyglottis bifistulosa

synonyma: *Senecio bifistulosus*

Brachyglottis brunonis

synonyma: *Centropappus brunonis*, *Senecio centropappus*

oblasti: Tasmánie

Roste v Tasmánii.

Brachyglottis buehneri

synonyma: *Senecio buehneri*

oblasti: Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v podobě keře. Dorůstá výšky do 3m. Listy jsou eliptické, tmavě zelené, lesklé, celokrajné, mírně plstnaté a dlouhé 2,5 - 11cm. Kvete v žlutými či béžovými květy úborech o průměru 1cm seskupených do řídkých lat či hroznů.

Brachyglottis caledoniae

synonyma: *Cineraria caledoniae*

oblasti: Nová Kaledonie

Brachyglottis cassinioides

synonyma: *Senecio cassinioides*

Brachyglottis christensenii

synonyma: *Senecio x christensenii*

Brachyglottis cockaynei

synonyma: *Senecio cockaynei*

Brachyglottis compacta

synonyma: *Senecio compactus*

oblasti: S Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v podobě poléhavého keře. Dorůstá výšky 0,6 - 1m. Větve jsou v mládí bíle plstnaté. Listy jsou mírně obvejčité, kožovité, vroubkované, zvlněné, dlouhé 2 - 4cm a v mládí plstnaté. Kvete žlutými květy v úboru o průměru 3cm a mohou být seskupené ještě do malých hroznů.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Brachyglottis elaeagnifolia

synonyma: *Senecio elaeagnifolius*

oblasti: S Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v podobě keře. Dorůstá výšky až 3 (i 5)m. Větve jsou v mládí nahnědle ochlupené. Listy jsou kožovité, široce kopinaté, tmavězelené, lesklé, na spodní straně stříbřité, ochlupené, dlouhé 5 - 9 (i 12)cm a řapíky jsou dlouhé 1 - 3,5cm. Květenstvím je bílý úbor o průměru 0,8 - 1cm seskupený do pyramidální až hroznovité laty. Plodem je nažka délky 1 - 2mm s chmýrem délky do 5mm.

Brachyglottis forsteri

synonyma: *Cineraria forsteri*

Brachyglottis greyi

synonyma: *Senecio greyi*

oblasti: Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v podobě stálezeleného bohatě větveného keře. Dorůstá výšky 1,2 - 1,5 (i 2)m a šířky 1,8m. Listy jsou střídavé, jednoduché, obvejčité, šedozelené, zvlněné, dlouhé 4 - 8cm, široké 2,5 - 4cm, na bázi uťaté a na spodní straně stříbřitě ochlupené. Kvete žlutými květy v úborech o průměru 3cm seskupených do terminálních chocholíků.

Vyhovuje mu plné slunce a dobře propustná chudá půda.

Brachyglottis haastii

synonyma: *Senecio haastii*

oblasti: J Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v trsech. Dorůstá výšky 20 - 35cm. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou

eliptické až okrouhlé, vroubkované, v mládí bíle ochlupené a dlouhé 0,5 - 1,5cm. Kvete žlutými květy v úbořech o průměru 2 - 4cm.

Vyhovuje mu středně úrodná a vlhká dobře propustná půda na plném slunci.

Množí se semeny, dělením nebo řízkem.

Brachyglottis hectori

synonyma: B. hectoris, Senecio hectorii

oblasti: Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v podobě keře. Dorůstá výšky do 4m. Větve jsou křehké a plstnaté. Listy jsou obkopynaté, peřenoklané až peřenosečné, pilovité, dlouhé 10 - 25cm a spodní strana je v mládí mírně plstnatá. Kvete v úbořech o průměru 5cm s bílými paprskovitými květy a jsou dále seskupené v řídkých terminálních chocholících.

Brachyglottis huntii

synonyma: Senecio huntii

oblasti: Tichý oceán

Roste na Chathamských ostrovech v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky až 6m. Listy jsou kopinaté, přisedlé, dlouhé 5 - 10cm, v mládí žlutohnědě plstnaté a báze je zúžená. Kvete ve žlutých úbořech s průměrem do 2cm seskupenými do terminálních lat.

Brachyglottis kirkii

synonyma: Senecio glastifolius, Senecio kirkii, Senecio neo-zealandicus, Solidago arborescens, Urostemon kirkii

oblasti: Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v podobě keře, obvykle epifytického. Dorůstá výšky do 4m. Listy jsou kopinaté až kosočtvercovité, dužnaté, celokrajné nebo vykrajovaně zubaté a dlouhé 4 - 12cm. Kvete v úbořech o průměru 3 - 5cm s bílými paprskovitými 2 - 3cm dlouhými květy a jsou seskupené do chocholíků o průměru až 30cm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. angustior - listy kopinaté až úzce podlouhlé

Brachyglottis lagopus

synonyma: Senecio lagopus

oblasti: Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v trsech. Dorůstá výšky 15 - 25cm. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou široce eliptické, na spodní straně bíle ochlupené a dlouhé 5 - 15cm. Kvete žlutými květy v úbořech o průměru 2 - 4cm seskupenými v terminálním hrozně.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, plné slunce, chudá dobře propustná půda a suchý zimní

režim.

Množí se semeny, dělením nebo řízký.

Brachyglottis lapidosa

synonyma: Senecio x lapidosus

oblasti: J Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v podobě keře. Dorůstá výšky 10 - 20cm. Listy jsou mírně vejčité, tupé, kožovité, husté, ochlupené, dlouhé 3 - 4cm a na spodní straně bíle plstnaté. Kvete žlutými květy v samostatných úbořech o průměru do 2cm s plstnatým zákrovem.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, plné slunce, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízký.

Brachyglottis laxifolia

synonyma: Senecio laxifolius

oblasti: Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v podobě keře. Dorůstá výšky do 1 (i 1,5)m. Větve jsou v mládí plstnaté. Listy jsou tmavězelené, eliptické, kožovité, oboustranně špičaté, celokrajné nebo řídce vykrajované, prakticky kožovité, plstnaté, dlouhé (2,5 -) 5 - 6 (i 8)cm a na spodní straně stříbrošedé. Kvete v úbořech o průměru do 2 (i 2,5)cm, paprskité jsou žluté, dlouhé do 1cm, terčové tmavěčervené a úboř jsou dále seskupené do řídké laty.

Brachyglottis matthewsii

synonyma: Senecio x matthewsii

Brachyglottis monroi

synonyma: Senecio monroi

oblasti: J Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v podobě stálezeleného kompaktního keře. Dorůstá výšky i šířky 0,6 - 1m. Listy jsou obvejčité až podlouhlé, kožovité, zelené až hnědozelené, svrasklé, vroubkované, zvlněné, dlouhé (1 -) 2 - 4cm a na spodní straně bíle ochlupené. Kvete žlutými květy v úbořech o průměru 2 - 3cm seskupenými do terminálního chocholíku. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. elongata - listy dlouze eliptické

Vyhovuje mu středně úrodná vlhká dobře propustná půda v polostínu.

Množí se semeny nebo řízký.

Brachyglottis myrianthos

synonyma: Senecio cheesemani

Brachyglottis pentacopa

synonyma: Senecio pentacopus

oblasti: Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě.

Brachyglottis perdicioides

synonyma: Senecio multinerve, Senecio perdicioides, Senecio tripetaloides

oblasti: Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v podobě keře. Dorůstá výšky do 2m. Větve jsou ochlupené a pruhované. Listy jsou eliptické, vroubkovaně pilovité a dlouhé 2,5 - 5cm. Květenstvím je žlutý úbor o průměru 1cm seskupený do chocholíku.

Brachyglottis remotifolia

synonyma: Senecio x remotifolius

Brachyglottis repanda

synonyma: B. rangiora, B. repanda var. rangiora, Cineraria repanda, Senecio forsteri, Senecio georgii

oblasti: Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v podobě keře. Dorůstá výšky 5 - 6 (i 7)m. Listy jsou mírně vejčité, tupé, tmavězelené, lesklé, asymetricky vykrajované, zvlněné, dlouhé 5 - 25 (i 30)cm a na spodní straně ochlupené. Květenstvím je vrcholová lata délky do 25cm, šířky až 30cm a skládá se ze zelenobílých květů v úboru. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Purpurea' - listy růžovofialové, na spodní straně bílé
- var. rangiora/B. rangiora - listy dlouhé do 35cm, široké do 30cm, kožovité, prakticky lesklé; květy mají růžovofialový zákrov
- 'Variegata' - listy tmavězelené, uprostřed žlutozelené a i jinak žlutě či šedozeleně pestré

Brachyglottis revoluta

synonyma: Senecio revolutus, Senecio robustus

Brachyglottis rotundifolia

synonyma: Cineraria rotundifolia, Senecio reinoldii, Senecio rotundifolius

Brachyglottis saxifragoides

synonyma: Senecio saxifragoides

Brachyglottis sciadophila

synonyma: Senecio sciadophilus

oblasti: Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v podobě keře nebo liány. Dorůstá výšky do 5m. Větve jsou převislé a zkroucené. Listy jsou široce vejčité, hrubě zubaté, oboustranně ochlupené a dlouhé 2,5 - 5cm. Kvete v úbolech o průměru 8mm.

Brachyglottis southlandica

synonyma: Senecio southlandicus

Brachyglottis spedenii

synonyma: Senecio x spedenii

Brachyglottis stewartiae

synonyma: Senecio muelleri, Senecio stewartiae

oblasti: J Nový Zéland

Roste na Novozélandských subantarktických ostrovech a ostrovech Snare. Dorůstá výšky 6m. Kvete žlutými květy v úbolech.

Brachyglottis traversii

synonyma: Senecio traversii

oblasti: J Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v trsech. Dorůstá výšky 20 - 30cm. Stonek je větvený a žláznatě ochlupený. Listy jsou mírně vejčité a dlouhé 5 - 15cm. Kvete žlutými květy v úbolech o průměru 3 - 5cm.

Vyhovují mu kamenité vlhké půdy bohaté na živiny na plném slunci.

Množí se semeny, dělením nebo řízkem.

Brachyglottis turneri

synonyma: Senecio turneri

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1662>

<http://www-wedos.kadel.cz/skalnicky/t/kvResult.asp-Rod=Brachyglottis.htm>

