

Agarista revoluta

synonyma: *Agarista sprengelii*, *Andromeda ambigua*, *Andromeda nitida*, *Andromeda revoluta*, *Andromeda revoluta* var. *emarginata*, *Gaylussacia pulchra*, *Leucothoe bahiensis* var. *arrabidaei*, *Leucothoe bahiensis* var. *blanchetti*, *Leucothoe bahiensis* var. *salzmannii*, *Leucothoe revoluta*, *Leucothoe revoluta* var. *arrabidaei*, *Leucothoe revoluta* var. *blanchetti*, *Leucothoe revoluta* var. *salzmannii*, *Leucothoe revoluta* var. *sellowii*

čeleď: Ericaceae

oblasti: JV Brazílie

Roste v Brazílii v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 3 (i 6)m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou mírně vejčité, kožovité, celokrajné, tupé až hroité, podvinuté, dlouhé 1,3 - 4,5cm, široké 0,5 - 2,2cm, báze zakulacená až mírně srdčitá a řapíky jsou dlouhé 2 - 7mm. Květenstvím je úžlabní hrozen délky 1 - 6,5cm, vlastní květy mají 2 listence, koruna je válcovitá, červená až bílá, dlouhá 6 - 9mm a široká 3,5 - 5mm. Plodem je široce vejčitá tobolka délky 4 - 5,5mm a šířky 5 - 7mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *revoluta* - květy mají 3 - 9mm stopky
- var. *velutina* - květy mají stopky délky 0,6 - 1,1cm

<https://www.rostliny.net/>