

# Hottonia (Žebratka)

čeleď: Primulaceae

Roste na východě USA, v Evropě a severní Asii v podobě vodní trvalky. Listy vytvářejí malé růžice ponořené v mělké vodě nebo v bahně. Listy jsou peřenosečné, úkrojky čárkovité a ponořené jsou ještě jemnější. Vytváří mnoho přímých bezlistých fertilních lodyh.

Vyhovuje ji polostín ve stojaté až slabě tekoucí vodě. Je vhodná na okysličování vody.

Množí se lodyžními řízků.

## Hottonia inflata

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Texas, V Kanada, Virginie, Západní Virginie

Roste v USA a Kanadě. Dorůstá výšky do 20cm. Kvete bílými květy o průměru do 1cm.

## Hottonia palustris (Žebratka bahenní)

oblasti: Česká republika, Irsko, Itálie, Malá Asie (Anatolie), Německo, Polsko, Švýcarsko, Z Rusko

Roste prakticky v celé Evropě bez Balkánského poloostrova, dále na Sibiři a vzácně se objevuje i v Malé Asii. Dorůstá výšky 30 - 40 (i 60)cm. Oddenek je článkovaný, rozvětvený a plazivý. Ponořená část lodyhy se větví, v uzlinách kořenující. Vyznačuje se jemně zpeřenými peřenosečnými listy s čárkovitými úkrojky. Kvete bílými či narůžovělými květy o průměru až 2,5cm s 5ti korunními lístky, žlutým středem po 3 - 8mi v přeslenitých hroznech na vzpřímeném stvolu naplněném vzduchem. U nás patří mezi ohrožené druhy C3.

Vyhovuje ji polostín, mělké stojaté vody, slepá ramena, atp. Vyhovuje ji hloubka vody 80 - 10cm.

Množí se řízkováním.

Další informace:

<http://botany.cz/cs/hottonia-palustris/>

<https://www.rostliny.net/>