

Mentha spicata (Máta klasnatá)

synonyma: *Mentha balsamea*, *Mentha cordato-ovata*, *Mentha cordifolia*, *Mentha crispata* var. *lacerata*, *Mentha lacerata*, *Mentha lejeunei*, *Mentha longifolia* subsp. *undulata*, *Mentha longifolia* subsp. *viridis*, *Mentha longifolia* var. *crispata*, *Mentha longifolia* var. *piperella*, *Mentha longifolia* var. *undulata*, *Mentha mollissima* var. *undulata*, *Mentha pectinata*, *Mentha romana*, *Mentha rubicunda*, *M. var. spicata*, *Mentha sylvestris* var. *glabrata*, *Mentha sylvestris* var. *oblongifolia*, *Mentha viridis* f. *latifolia*, *Mentha viridis* subsp. *angustifolia*, *Mentha viridis* subsp. *crispata*, *Mentha viridis* subsp. *euryphylla*, *Mentha viridis* subsp. *exquisita*, *Mentha viridis* subsp. *inanimensis*, *Mentha viridis* subsp. *malinvaldii*, *Mentha viridis* var. *allodonta*, *Mentha viridis* var. *angustifolia*, *Mentha viridis* var. *cordato-ovata*, *Mentha viridis* var. *exquisita*, *Mentha viridis* var. *glabrata*, *Mentha viridis* var. *holotilla*, *Mentha viridis* var. *hortensis*, *Mentha viridis* var. *jaccardii*, *Mentha viridis* var. *lacerata*, *Mentha viridis* var. *laetiviridis*, *Mentha viridis* var. *laevigata*, *Mentha viridis* var. *lampreilema*, *Mentha viridis* var. *lejeuneana*, *Mentha viridis* var. *macrostemma*, *Mentha viridis* var. *maderensis*, *Mentha viridis* var. *malinvaldii*, *Mentha viridis* var. *ocymiodora*, *Mentha viridis* var. *oligotricha*, *Mentha viridis* var. *phaneroneura*, *Mentha viridis* var. *phyllopogon*, *Mentha viridis* var. *piperella*, *Mentha viridis* var. *sinuosa*, *Mentha viridis* var. *spadana*, *Mentha viridis* var. *stenophyllon*, *Mentha viridis* var. *tauscheri*, *Mentha viridis* var. *tenuiflora*, *Mentha viridis* var. *tenuis*, *Mentha viridis* var. *walteriana*, *Mentha x piperita* var. *inanimensis*

čeleď: Lamiaceae

oblasti: Alabama, Albánie, Alberta, Aljaška, Andalusie, Arizona, Arkansas, Arménie, Ázerbájdžán, Belgie, Bosna a Hercegovina, Britská Kolumbie, Bulharsko, Chorvatsko, Connecticut, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Delaware, Egypt, Florida, Georgia, Gruzie, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Itálie, Izrael, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Jordánsko, JZ Rusko, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Kosovo, Kréta, Kypr, Libanon, Louisiana, Lucembursko, Maďarsko, Maine, Makedonie, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nizozemí, Norsko, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rakousko, Řecko, Rhode Island, Rumunsko, Sardínie, Saskatchewan, Severní Karolína, Sicílie, Sinajský poloostrov, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Švédsko, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Turecko, Ukrajina, Utah, Velká Británie, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Z Evropa, Západní Virginie

Roste v jižní Evropě a jihozápadní Asii jako vzpřímená trvalka. Dorůstá výšky 0,3 - 0,6 (i 1)m. Stonky jsou 4hranné, tmavě zelené, téměř holé až hustě ochlupené. Listy jsou úzce vejčité až úzce kopinaté, špičaté až zašpičatělé, pilovité, dlouhé (2 -) 3,5 - 6 (i 9)cm, široké (0,5 -) 0,5 - 1,5 (i 3)cm, žilnatinu tvoří 7 - 10 párů žilek a řapíky dlouhé max. 2mm. Kvete v lichoklasech, listeny jsou čárkovité až úzce kopinaté, max. délky květů, vlastní květy mají kalich je úzce zvonkovitý až trubkovitý, dlouhý (1,5 -) 1,7 - 2 (i 3)mm, z 1/3 (i z 1/2) 3úhlé cípatý, trubka má 10 - 12 žilek a koruna je světlorůžová a má velikost 4 - 5mm. Patří k invazivním rostlinám. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *Crispa* (Marocká máta) - kadeřavé špičaté listy
- subsp. *condensata*/M. *microphylla* (Máta klasnatá východní) - povrch hustě šedě ochlupený; střední a horní lodyžní listy eliptické až vejčité kopinaté, řídce pilovité; tvrdky hnědé s hnědočernou síťovinou
- 'Nana'/'Maroccan' - pochází z Maroka, dodává lahodnější chuť do cukrovinek nebo čajů
- 'Spearmint'
- subsp. *spicata* (Máta klasnatá pravá) - západní a jihozápadní Evropa; povrch prakticky holý; listy kopinaté až podlouhlé nebo zkadeřené, vejčité až kulaté tvrdky tmavěhnědé s málo nápadnou texturou

Vyhovují ji vlhké půdy, okraje cest, rumišť, vlhké trávníky, atp.

<https://www.rostliny.net/>