

Potamogeton crispus (Rdest kadeřavý)

synonyma: *Buccaferrea crispata*, *Potamogeton crenulatus*, *Potamogeton crispatus*, *P. var. najadoides*, *P. var. serrulatus*, *Potamogeton lactucaceum*, *Potamogeton macrorrhynchus*, *Potamogeton serrulatus*, *Potamogeton tuberosus*

čeleď: Potamogetonaceae

oblasti: Alabama, Alberta, Andalusie, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Itálie, Jižní Dakota, Jugoslávie, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Makedonie, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Pochází z Euroasie. Rozšířil se ale do Severní Ameriky, kde se stal invazivním druhem. Patří mezi trvalky. Délka stonku dosahuje 0,2 - 0,8 (i 1,5)m a průřez je čtvercový. Okraje obkopinatých 10cm dlouhých, 0,5 - 1,1cm širokých listů jsou výrazně zvlněné, drobně pilovité, všechny jsou ponořené pod hladinu a mají (3 -) 5 žilek. Plody mají velikost asi 5mm a jsou opatřeny háčkovitým zobáčkem.

Pro akvarijní pěstování je ideální teplota 16 - 22°C. Vyhovují mu rybníky i potoky bohaté na živiny se stojatou nebo mírně tekoucí vodou.

Množí se řízkováním.

<https://www.rostliny.net/>