

Anisoptera (Nestejnokřídlec)

čeleď: Dipterocarpaceae

Roste v podobě stromu od Bangladéše po Novou Guineu. Rodové jméno je složeninou řeckých slov anisos = nepravidelný a pteron = křídlo. Koruna je menší, asymetricky polokulovitá a protáhlá. Větve jsou zkroucené, vystoupavé, umístěné na vrcholku a v mládí jsou hustě šupinatě ochlupené. Palisty jsou dlouhé a úzké. Listy jsou ochlupené. Květenství je dlouhé, řídké a převislé, listence jsou malé a tenké, kalich má 2 tupé vnější laloky a 3 vnitřní špičaté, korunní lístky jsou tenké a tyčinek má 15 - 65ks.

Anisoptera aurea

synonyma: *A. curtisii*

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách v podobě stromu. Borka je světlá. Listy jsou podlouhlé až obkopynaté, mírně kožovité, špičaté, dlouhé 7 - 11cm, široké 2,5 - 5,5cm, spodní strana má vystouplou žilnatinu z 15 - 20ti párů žilek, je zlatě šupinatá, báze je klínovitá (i tupá) a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 2,7cm. Květenstvím je převislá až 12cm řídká terminální nebo úžlabní lata s větvemi o délce do 1,5cm a 3mi květy, kališní lístky jsou dlouze 3úhlé a tyčinek má 35 - 38ks. Plody jsou prakticky kulovité a mají až 4mm stopku.

Anisoptera costata

synonyma: *A. cochinchinensis*, *A. marginatoides*, *A. mindanensis*, *A. oblonga*, *A. robusta*, *Dryobalanops hallii*

oblasti: Borneo, Filipíny, Jáva, Kambodža, Malajsie, Myanmar (Barma), Sumatra, Thajsko

Roste v jihovýchodní Asii. Větve jsou v mládí hranaté, později rýhované až hladké a kulaté. Palisty jsou špičaté, dlouhé 8mm, široké 3mm. Listy jsou dlouze obvejčité, špičaté, max. mírně podvinuté, dlouhé 6 - 18cm, široké 7 - 11cm, spodní strana šedozeleně až zlatě šupinatá a řapíky jsou dlouhé 2 - 4cm. Květenstvím je terminální nebo úžlabní až 20cm dlouhá převislá lata s 5tikvětými větvemi, listence jsou dlouhé do 4mm, široké 2mm, vlastní květy mají béžovou korunu s hrálovitými korunními lístky a 25 - 35ti tyčinkami.

Anisoptera curtisii

oblasti: Malajsie, Sumatra

Roste v Malaisii a Sumatře v podobě stromu. Povrch je v mládí ochlupený. Palisty jsou úzce kopinaté, špičaté, dlouhé do 7mm, široké 2mm. Listy jsou kožovité, mírně obkopynaté, špičaté, dlouhé 4 - 14cm, široké 1,5 - 6cm, žilnatinu tvoří 15 - 25 párů žilek, spodní strana je zlatě šupinatá a řapíky jsou dlouhé 1,3 - 2,3cm. Květenstvím je terminální nebo úžlabní převislá lata o délce do 18cm s až 2,5cm větvemi s až 7mi květy, vlastní květy jsou bílé, kališní lístky přišpičaté, kopinaté a mají 25 tyčinek.

Anisoptera grossivenia

oblasti: Borneo

Roste na Borneu v podobě stromu. Povrch je nazlátle šupinatý. Palisty jsou hrálovité, špičaté, dlouhé 8mm a široké 2,5mm. Listy jsou obvejčité, mírně puchýřnaté, špičaté, dlouhé 9 - 12cm, široké 3 - 5cm, žilnatinu tvoří 18 - 28 párů žilek, báze je klínovitá a řapíky jsou dlouhé 2 - 2,5cm. Květenstvím je terminální nebo úžlabní převislá lata délky do 20cm, větve jsou dlouhé do 5cm a mají až 8 květů, vlastní květy přecházejí z růzovofialové do žluté a mají 36 tyčinek.

Anisoptera laevis

oblasti: Brunej, Malajsie

Roste v Malajsii a Borneu v podobě stromu. Palisty jsou hrálovité až čárkovité, dlouhé 1cm a široké 3mm. Listy jsou mírně obvejčité, špičaté, dlouhé 7 - 11cm, široké 3 - 4cm, žilnatinu tvoří 10 - 14 párů žilek, spodní strana je rezavě šupinatá, báze je tupá a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 2cm. Květenstvím je terminální nebo úžlabní převislá řídká ochlupená lata s krátkými větvemi s až 11ti květy a ty mají 15 tyčinek.

Anisoptera marginata

synonyma: A. grandiflora

oblasti: Borneo, Malajsie, Sumatra

Roste v Malajsii, Sumatře a Borneu v podobě stromu. Palisty jsou čárkovité, tupé a dlouhé 8mm. Listy jsou mírně obvejčité, u mladých exemplářů puchýřnaté, špičaté, dlouhé 7 - 10cm, široké 3,5 - 4,5cm, báze tupá, žilnatinu tvoří 10 - 14 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 2cm. Květenstvím je terminální nebo úžlabní převislá až 14cm lata, vlastní květy jsou nažloutlé, korunní lístky trásnité a mají 25 tyčinek.

Anisoptera megistocarpa

oblasti: Malajsie, Sumatra, Thajsko

Roste v Thajsku, Malajsii a Sumatře v podobě stromu. Povrch je ochlupený. Palisty jsou dlouhé do 1,2cm a široké 6mm. Listy jsou mírně obkopinaté, kožovité, mírně podvinuté, dlouhé 5,5 - 20cm, široké 2,5 - 8cm, žilnatinu tvoří 23 - 33 párů žilek, báze je tupá a řapíky jsou dlouhé 2 - 2,8cm. Květenstvím je terminální nebo úžlabní převislá lata délky do 12cm s až 3,5cm větvemi s až 5ti květy, vlastní květy jsou bílé.

Anisoptera polyandra

synonyma: A. thurifera

Anisoptera reticulata

Anisoptera scaphula

synonyma: *A. glabra*, *Scaphula glabra*

oblasti: Bangladéš, Malajsie, Myanmar (Barma), Thajsko

Roste od Indočíny po Malajsii a Thajsko v podobě vysokého stromu. Mladé části jsou nazelenale šupinaté. Palisty jsou čárkovité, špičaté, dlouhé do 2cm, široké 3mm. Listy jsou kopinaté až obkopinaté, špičaté, dlouhé 8 - 16cm, široké 3,5 - 8cm, žilnatinu tvoří 13 - 18 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1,2 - 3,2cm. Květenstvím je terminální nebo úžlabní převislá lata délky do 9cm, vlastní květy jsou bílé a mají 15 tyčinek.

Anisoptera thurifera

synonyma: *A. brunnea*, *A. calophylla*, *A. lanceolata*, *A. tomentosa*, *A. vidaliana*, *Antherotriche lanceolata*, *Dipterocarpus thurifer*

oblasti: Filipíny, Melanésie, Nová Guinea, Sulawesi (Celebes)

Roste na Filipínách v podobě stromu. Povrch je šupinatý. Palisty jsou čárkovité, dlouhé do 8mm. Listy jsou mírně kožovité, eliptické až obkopinaté, špičaté, dlouhé 6 - 15cm, široké 2,5 - 6,5cm, báze klínovitá, žilnatinu tvoří 12 - 20 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1,7 - 3,5cm. Květenstvím je úžlabní až téměř terminální převislá až 20cm dlouhá lata s větvemi s až 11ti květy a vlastní květy mají 45 - 47 tyčinek. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *polyandra*/*A. forbesii*/*A. kostermansiana*/*A. polyandra*/*Dipterocarpus microcarpus*/*Dipterocarpus parviflora* - Nová Guinea, Sulawesi, Moluky; listy mírně obvejčité, prakticky kožovité, krátce špičaté, dlouhé 8,5 - 18cm, široké 3,5 - 8,5cm, báze klínovitá až srdčitá, žilnatinu tvoří 10 - 17 párů žilek; květy mají 37 - 57 tyčinek
- subsp. *thurifera* - Filipíny

Další informace:

<http://database.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=4869>

<https://www.rostliny.net/>