

Lithocarpus celebicus

synonyma: *Cyclobalanus celebica*, *Cyclobalanus concentrica*, *Cyclobalanus llanosii*, *Lithocarpus aculeatus*, *Lithocarpus brachycladus*, *Lithocarpus dalbertisii*, *Lithocarpus lipacon*, *Lithocarpus llanosii*, *Lithocarpus mabesae*, *Lithocarpus papuanus*, *Pasania aculeata*, *Pasania companoana*, *Pasania dalbertisii*, *Pasania papuana*, *Quercus brachyclada*, *Quercus celebica*, *Quercus companoana*, *Quercus concentrica*, *Quercus dalbertisii*, *Quercus gulliveri*, *Quercus lipacon*, *Quercus llanosii*, *Quercus mabesae*, *Quercus pseudomolucca* var. *papuana*, *Quercus sundaica*, *Synaedrys brachyclada*, *Synaedrys celebica*, *Synaedrys dalbertisii*, *Synaedrys gulliveri*, *Synaedrys llanosii*

čeleď: Fagaceae

oblasti: Filipíny, Melanésie, Nová Guinea, Sulawesi (Celebes)

Roste v jihovýchodní Asii v podobě stromu. Dorůstá výšky 10 - 33m při průměru kmene 0,3 - 1m. Borka je šedohnědá. Větve jsou šedohnědé, v mládí ochlupené. Palisty jsou dlouhé 3 - 4mm a široké 1mm. Listy jsou mírně kožovité, šedohnědé, mírně lesklé, zašpičatělé, dlouhé 8 - 20cm, široké 3 - 8cm, spodní strana přitiskle ochlupená, báze klínovitá, žilnatinu tvoří 6 - 12 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1cm. Květenství může být samčí, oboupohlavné nebo smíšené, samčí květy vyrůstají po 3ks, samičí samostatně (i po 2 - 3ks). Plodenství má pohárkovité číšky na až 5mm stopce, délky 0,6 - 1cm, průměru 2 - 3cm, nažky jsou kuželovitě vejčité, hnědé, dlouhé 2 - 2,5cm a široké 1,6 - 2,3cm.

<https://www.rostliny.net/>