

Amaranthus (Laskavec)

čeleď: Amaranthaceae

Roste v Africe, Severní a Jižní Americe jako jednoletka. Dorůstá výšky 0,5 - 3m. Květenství tvoří malá vzpřímená nebo převislá klubíčka. Plodem je nažka nebo tobolka obsahující drobná semena. Nejznámějším druhem je *A. caudatus*. Některé druhy je možné využít jako potrava. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Hopi Red Dye'

Vyhovuje mu plné slunce a teplo. Některým druhům se líbí vlhčí vzduch, živnou půdu s bohatou záhlvkou, jiné mají rádi raději sušší prostředí a písčitou půdu.

Množí se semeny.

Amaranthus acanthobracteatus

Amaranthus acanthochiton

oblasti: Arizona, Nové Mexiko, Texas, Utah

Pochází z jihozápadu USA a severního Mexika. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 10 - 80cm. Listy mají délku 2 - 8cm a šířku 0,2 - 1,2cm. Kvete světlezelenými květy v klasech. Semena jsou hnědá, v průměru mají lehce přes 1mm.

Amaranthus acutilobus

Amaranthus albus (Laskavec bílý)

oblasti: Alabama, Alberta, Aljaška, Andalusie, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kazachstán, Kentucky, Kolorado, Labrador, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Pochází ze Severní Ameriky. Patří mezi jednoletky. Stonky se plazí po zemi. Mohou dosáhnout výšky 0,1 - 0,65 (i 1)m. Listy má obkopinaté, dlouhé 1 - 5cm. Okvětní lístky jsou pouze 1mm dlouhé. Barva květů je zelená. Plodem je tobolka.

Vyhovuje mu písčité půdy, slaniska, pole (okopaniny), okraje cest, skládky, atp.

Amaranthus anderssonii

Amaranthus arenicola

oblasti: Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Michigan, Missouri, Montana, Nebraska, New Jersey, Nové Mexiko, Oklahoma, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Virginie, Wisconsin, Wyoming

Pochází z USA. Dorůstá výšky až 2m.

Amaranthus asplundii

Amaranthus atropurpureus

Amaranthus aureus

Amaranthus australis

oblasti: Alabama, Florida, Jižní Amerika, Louisiana, Mississippi, Portoriko, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie

Patří mezi jednoletky nebo krátce žijící trvalky (podle podmínek). Dorůstá výšky 1 - 3 (i 9)m. Pochází z jihu USA a Jižní Ameriky.

Amaranthus bahiensis

Amaranthus bigelovii

oblasti: Louisiana, Nové Mexiko, Texas

Patří mezi jednoletky. Pochází z jihu USA.

Amaranthus bigelowii

Amaranthus blitoides (Laskavec žmindovitý)

oblasti: Alabama, Albánie, Alberta, Aljaška, Alžírsko, Andalusie, Arizona, Arkansas, Baleáry, Belgie, Bělorusko, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Egypt, Florida, Francie, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Izrael, Jižní Dakota, Jižní Karolína, JZ Rusko, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Korsika, Kréta, Litva, Louisiana, Maďarsko, Maine, Manitoba, Maroko, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nizozemí, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Portugalsko, Quebec, Rakousko, Řecko, Rhode Island, Sardinie, Saskatchewan, Severní Dakota, Sicílie, Sinajský poloostrov, Slovensko, Srbsko, SZ Rusko, Švédsko, Tennessee, Texas, Tunisko, Turecko, Utah, Velká Británie, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Z Rusko, Západní Virginie

Roste v centrální části nebo na východě USA. Dorůstá výšky 0,15 - 0,6 (i 1)m. Lodyha bývá bělavá. Malé listy mají kopinatý nebo vejčitý tvar. Kvete zelenými květy. Plodem je kulatá tobolka. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. blitoides
- var. halophilus

Vyhovují mu suché půdy. Dokáže růst i v zasolené půdě.

Amaranthus blitum (Laskavec hrubozel)

synonyma: A. blitoides, A. lividus, A. lividus subsp. ascendens

oblasti: Alabama, Albánie, Alžírsko, Andalusie, Ázerbájdžán, Baleáry, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Connecticut, Černá Hora, Česká republika, Egypt, Estonsko, Florida, Francie, Georgia, Gruzie, Itálie, Izrael, Jižní Karolína, JZ Rusko, Kalifornie, Katalánsko, Korsika, Kosovo, Litva, Lotyšsko, Louisiana, Maďarsko, Makedonie, Maroko, Maryland, Massachusetts, Missouri, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Nizozemí, Nové Skotsko, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Polsko, Portugalsko, Quebec, Rakousko, Řecko, Sardínie, Severní Karolína, Sicílie, Sinajský poloostrov, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Tunisko, Utah, Velká Británie, Vermont, Virginie, Washington

Pochází asi ze středozeemí. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 10 - 30cm. Lodyha je holá. Kvete zelenými květy. Plodem je nažka vejčitého tvaru délky 1,5 - 3mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. blitum (Laskavec hrubozel pravý)
- subsp. emarginatus
- subsp. oleraceus
- var. pseudogracilis

Vyhovují mu písčité až hlinité půdy, rumišťe, skládky, okraje cest a zdí, pole, atp.

Amaranthus bouchonii (Laskavec Bouchonův)

oblasti: Kalifornie, Montana, Oregon, Pennsylvania, Švýcarsko, Washington

Pochází ze západu USA. Patří mezi jednoletky. Plody jsou nepukavé.

Amaranthus brandegeei

Amaranthus brasiliensis

Amaranthus brownii

oblasti: Havajské ostrovy

Pochází z Havajských ostrovů. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 30 - 90cm. Listy má úzké, lineární. Kvete malými zelenými květy, které plodí tmavěčervené semena. Vytváří samčí a samičí

květy.

Amaranthus californicus

oblasti: Alberta, Idaho, Jižní Dakota, Kalifornie, Kansas, Montana, Nebraska, Nevada, Oregon, Saskatchewan, Texas, Utah, Washington, Wyoming

Pochází ze západu USA a Kanady. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 10 - 50cm.

Amaranthus campestris

Amaranthus cannabinus

oblasti: Alabama, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Virginie

Pochází z východu USA. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 1 - 3m.

Amaranthus capensis

Amaranthus caracasanus

Amaranthus cardenasianus

Amaranthus caturus

Amaranthus caudatus (Laskavec ocasatý)

oblasti: Arizona, Bosna a Hercegovina, Connecticut, Česká republika, Delaware, Egypt, Florida, Idaho, Illinois, Írán, Itálie, Jižní Amerika, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kypr, Maine, Makedonie, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Německo, New York, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Portoriko, Rumunsko, Sicílie, Sinajský poloostrov, Srbsko, Švédsko, Švýcarsko, Tennessee, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin

Pochází pravděpodobně z Jižní Ameriky. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 0,3 - 1,2 (i 1,5)m. Stonek je bohatě větvený. Listy jsou mají vejčitý, kopinatý nebo eliptický tvar s plastickou žilnatinou, délku 2,5 - 15cm, šířku 1 - 8cm a řapík délky do 8cm. Kvete visícími zelenými (většinou se ale setkáte s červenými z různých kultivarů) květy v paklasu délky i více než 30cm, šířky 1,5cm, od spodní strany je převislý, vlastní květy jsou 5tičetné, samčí mají kališní lístky úzce eliptické, špičaté, dlouhé 2,5 - 3,5mm, samičí jsou dlouhé 1,75 - 2,5mm. Plodem je nažka délky 2 - 2,5mm. Listy i semena jsou jedlá. Existují vnitrodruhové taxony:

- f. atro-purpureus
- f. albiflorus - bílé květy

- subsp. caudatus/subsp. alopecurus (Laskavec ocasatý pravý) - černá semena
- f. gibbosus
- f. viridis
- subsp. saueri (Laskavec ocasatý Sauerův) - bílou nebo narůžovělá semena

Vyhovuje mu plné slunce. Nesnáší teploty pod 0°C. Ideální půdou je lehká humózní a vápnitá, ale není nezbytně nutná.

Množí se semeny.

Amaranthus celosioides

Amaranthus centralis

Amaranthus chihuahensis

Amaranthus chihuahuensis

oblasti: Malawi, S Mexiko, USA

Pochází z USA a severu Mexika.

Amaranthus chlorostachys

oblasti: Alabama, Arizona, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Dakota, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Západní Virginie

Pochází z Pákistánu. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. chlorostachys
- var. erythrostachys

Amaranthus clementii

Amaranthus cochleitepalus

Amaranthus commutatus

Amaranthus congestus

Amaranthus crassipes

oblasti: Alabama, Arizona, Florida, Jižní Karolína, Nové Mexiko, Pennsylvania, Portoriko, Texas

Patří mezi jednoletky. Nepřesahuje výšku 0,5m. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. crassipes
- var. warnockii

Amaranthus crispus (Laskavec kadeřavý)

oblasti: Argentina, Německo, New Jersey, New York, Severní Karolína, Virginie

Pochází z Argentiny a roste dále např. na východě USA. Dorůstá výšky 0,5m. Lodyha má zelenou až červenavou barvu a je hustě jemně ochlupená. Listy mají kosníkovitě vejčitý až kopinatý tvar délky 0,5 - 1,5cm s výrazně zvlněným okrajem. Kvete zelenými květy. Plodem je svrasklá široce eliptická nažka.

Vyhovují mu okraje cest, skládky, okraje komunikací, atp.

Amaranthus cruentus (Laskavec krvavý)

synonyma: A. paniculatus

oblasti: Alabama, Albánie, Alžírsko, Andalusie, Arizona, Baleáry, Britská Kolumbie, Bulharsko, Connecticut, Česká republika, Delaware, Egypt, Francie, Havajské ostrovy, Illinois, Indiana, Írán, Itálie, Izrael, Jižní Karolína, Kalifornie, Kentucky, Korsika, Kréta, Kypr, Libye, Maďarsko, Maine, Maroko, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Portoriko, Portugalsko, Quebec, Rhode Island, Rumunsko, Sardínie, Severní Karolína, Sinajský poloostrov, Švýcarsko, Texas, Tunisko, Turecko, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Západní Virginie

Pochází zřejmě ze Severní Ameriky. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 0,2 - 0,7 (i 2)m. Kvete růžovými, červenými nebo fialovými květy. Semena jsou jedlá.

Vyhovují mu rumiště, skládky, břehy, atp.

Amaranthus cuspidifolius

Amaranthus deflexus (Laskavec skloněný)

oblasti: Alabama, Albánie, Alžírsko, Andalusie, Argentina, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čile, Florida, Francie, Georgia, Írán, Itálie, J Brazílie, Japonsko, JZ Rusko, Kalifornie, Katalánsko, Keňa, Korsika, Kréta, Krym, Lesotho, Libye, Louisiana, Maďarsko, Makaronésie, Maroko, Maryland, Massachusetts, Mexiko, Německo, New Jersey, New York, Ohio, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Portugalsko, Řecko, Rumunsko, Sardínie, Sicílie, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Švýcarsko, Tennessee, Tunisko, Turecko, Uruguay, Velká Británie, Virginie

Pochází z Jižní Ameriky. Patří mezi krátce žijící trvalky nebo jednoletky. Dorůstá výšky (8 -) 13 - 45 (i 80)cm. Stonek bývá bohatě větvený, zelený nebo načervenalý a ochlupený. Listy jsou vejčité až kopinaté, dlouhé 1 - 4,5cm, široké 0,5 - 2,5cm, báze srdčitá až uťatá, spodní strana ochlupená a řapíky jsou dlouhé 0,6 - 2,5cm. Kvete v paždí listů a na koncích lodyh, květenství je dlouhé 2 - 10cm, široké 0,5 - 1,2cm, vlastní květy jsou ještě seskupené do 1cm skupin, samčí i samičí květy vyrůstají společně, kališní lístky jsou úzce podlouhlé a dlouhé (1,2 -) 2 - 3mm. Plodem je vejčitá hladká eliptická nažka délky 2 - 3mm se 2 - 3mi podélnými žilkami a obsahuje černá semena délky 1 - 1,2mm a šířky 0,7 - 0,8mm.

Vyhovuje mu teplo.

Amaranthus dinteri

Amaranthus dubius

oblasti: Afrika, Asie, Evropa, Florida, Havajské ostrovy, Massachusetts, Portoriko

Roste v Evropě, Asii a Africe. Dorůstá výšky 80 - 120cm.

Amaranthus fimbriatus

oblasti: Arizona, Kalifornie, Mexiko, Nevada, Nové Mexiko, Texas, Utah

Pochází z jihozápadu USA a Mexika. Dorůstá výšky 70cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. denticulatus
- var. fimbriatus

Amaranthus floridanus

oblasti: Florida

Dorůstá výšky 1,5m.

Amaranthus furcatus

Amaranthus gangeticus

oblasti: Louisiana, Michigan, Mississippi, Missouri, Portoriko, Střední středozemí

Patří mezi jednoletky.

Amaranthus globosa

Amaranthus graecizans (Laskavec úzkolistý)

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Baleáry, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Egypt, Estonsko, Finsko, Francie, Gruzie, Írán, Itálie, JZ Rusko, Katalánsko, Korsika, Kréta, Krym, Kypr, Libye, Makaronésie, Makedonie, Maroko, Moldávie, Německo, New Jersey, Pákistán, Portugalsko, Řecko, Sardínie, Sicílie, Sinajský poloostrov, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Velká Británie, Z Rusko

Pochází ze středozeemí. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 15 - 45 (i 70)cm. Listy jsou vejčité až úzce kopinaté, špičaté až zaoblené, dlouhé 0,4 - 5,5cm, široké 0,2 - 3cm, na spodní straně ochlupené a řapík je dlouhý 3 - 4,5mm. Listy má jedlé. Kvete zelenými květy, kalich je 3četný a dlouhý 1,5 - 2mm. Plody jsou dlouhé 2 - 2,25mm a obsahují černá zploštělá semena délky 1 - 1,25mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *graecizans* (Laskavec úzkolistý pravý)
- var. *pachyterpalus*
- var. *polygonoides*
- var. *sylvestris* (Laskavec úzkolistý planý) - vystoupavé nebo přímé vzácně poléhavé lodyhy; výška 20 - 45cm; široké listy; kvete v úžlabních kloubíčcích; zahrady, vinice, pole
- subsp. *thellungianus* - úzké listy

Amaranthus grandiflorus

Amaranthus greggii

oblasti: Louisiana, S Mexiko, Texas

Roste na jihu USA a severu Mexika na písčitéch dunách nedaleko moře. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 1m.

Amaranthus haughtii

Amaranthus hunzikeri

Amaranthus hybridus (Laskavec rozkladitý)

synonyma: *A. patulus*

oblasti: Alabama, Albánie, Alžírsko, Andalusie, Arizona, Arkansas, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Connecticut, Delaware, Egypt, Florida, Francie, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Korsika, Kréta, Kypr, Libye, Louisiana, Maďarsko, Maine, Makaronésie, Manitoba, Maroko, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nizozemí, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Polsko, Portugalsko, Quebec, Řecko, Rhode Island, Rumunsko, Sardínie, Severní Dakota, Severní Karolína, Sicílie, Sinajský poloostrov, Slovinsko, Srbsko, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Tunisko, Turecko, Velká Británie, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Západní Virginie

Pochází ze Severní Ameriky. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 0,2 - 1 (i 3)m. Stonek je větvený. Listy dlouhé 3 - 19 (i 30)cm, široké 1,5 - 8 (i 12)cm a řapíky jsou dlouhé do 15cm. Květenstvím je

vrcholový klas nebo hrozen délky do 45cm a šířky 25cm, samčí i samičí květy jsou rozmístěné promíchaně, barva je nejprve zelená, přechází do žluté a končí u červené. Plody mají velikost 2 - 3mm a obsahují černá zploštělá semena velikosti 0,75 - 1,25mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. bouchonii
- subsp. cruentus
- subsp. hybridus (Laskavec rozkladitý pravý)
- subsp. hypochondriacus
- subsp. quitensis

Vyskytuje se na březích, skládkách, rumišťích, atp.

Amaranthus hypochondriacus (Laskavec červenoklasý)

synonyma: A. chlorostachys var. erythrostachys

oblasti: Andalusie, Arizona, Florida, Kalifornie, Kansas, Massachusetts, Mexiko, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New York, Nové Mexiko, Pennsylvania, Střední Amerika, Švýcarsko, Texas, Utah, Wisconsin

Pochází z Mexika a tropické Ameriky. Dorůstá výšky 15 - 70cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Green Thumb'
- 'Pygmy Torch'

Amaranthus induratus

Amaranthus interruptus

Amaranthus kloosianus

Amaranthus leptostachyus

Amaranthus lepturus

Amaranthus leucocarpus

oblasti: Arizona, Florida, Kalifornie, Kansas, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New York, Nové Mexiko, Pennsylvania, Texas, Utah, Wisconsin

Amaranthus lineatus

oblasti: Havajské ostrovy

Amaranthus lividus

oblasti: Alabama, Connecticut, Florida, Georgia, Havajské ostrovy, Írán, Jižní Karolína, Kalifornie, Louisiana, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Ohio, Ontario, Pákistán, Pennsylvania, Polsko, Portoriko, Quebec, Severní Karolína, Středozeří, Tennessee, Utah, Virginie, Washington

Pochází ze středozeří. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky (6 -) 10 - 80 (i 90)cm. Listy vyrůstají střídavě, jsou vejčité, dlouhé 1 - 8cm, široké 0,6 - 6cm a řapíky jsou dlouhé. Kvete zelenými květy v klasu nebo hrozu délky 6 - 11cm a šířky 0,3 - 2cm. Plodem je vejčitá nažka velikosti 1,25 - 2,5mm a obsahuje kulatá zploštělá hnědá až černá semena velikosti 1 - 1,75mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *ascendens*

Potřebuje teplo a dusíkaté půdy.

Amaranthus lombardoi

Amaranthus looseri

Amaranthus macrocarpus

Amaranthus mangostanus

Amaranthus mantegazzianus

Amaranthus minimus

Amaranthus mitchellii

Amaranthus muricatus

oblasti: Alabama, Andalusie, Francie, Itálie, Katalánsko, Maroko, Portugalsko, Řecko, Sardínie, Střední středozeří

Dorůstá výšky 15 - 55 (i 60)cm. Listy jsou čárkovité až kopinaté, dlouhé 2 - 5cm a dlouze řapíkaté.

Amaranthus obcordatus

oblasti: Arizona, Nové Mexiko, Texas

Amaranthus oleraceus (Laskavec jedlý)

oblasti: Indie, Střední Asie

Patří mezi jednoletky. Pochází z Indie. Dorůstá výšky až 1m. Listy světlezelené barvy s hnědofialovými skvrnami mají široce kopinatý tvar. Kvete v latě zelenohnědými květy.

Potřebuje pravidelnou zálivku, teplo a půdu bohatou na živiny.

Množí se semeny.

Amaranthus pallidiflorus

Amaranthus palmeri (Laskavec Palmerův)

oblasti: Arkansas, Florida, Georgia, Illinois, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, Nebraska, Nevada, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Utah, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Pochází z jihu Severní Ameriky. Listy mají kosníkově vejčitý až kopinatý tvar. Délka listenců dosahuje 4mm.

Amaranthus paniculus

Amaranthus paolii

Amaranthus paraguayensis

Amaranthus parvulus

Amaranthus patulus

oblasti: Alabama, Arizona, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Dakota, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Západní Virginie

Amaranthus persimilis

Amaranthus peruvianus

Amaranthus polygamus

Amaranthus polygonoides

oblasti: Florida, Jižní Karolína, Nové Mexiko, Texas

Amaranthus polystachyus

Amaranthus powellii (Laskavec zelenoklasý)

oblasti: Alberta, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Florida, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kolorado, Louisiana, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, S Mexiko, Saskatchewan, Severní Karolína, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Pochází z jihozápadu USA a severního Mexika. Dorůstá výšky až téměř 2m. Listy jsou dlouhé 2,5 - 15cm a mají vejčitý tvar. Kvete v úzkém paklase se samčími i samičími květy dohromady. Plodem je tobolka. Semena mají 3mm délku a jsou tmavě hnědočervená.

Vyhovují mu rumišťe, skládky, atp. se suší půdou bohatou na dusík.

Amaranthus praetermissus

Amaranthus pringlei

oblasti: Arizona, Nevada

Amaranthus pumilus

oblasti: Connecticut, Delaware, Jižní Karolína, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Virginie

Patří mezi jednoletky. Jedná se spíše o plazivou rostlinu.

Amaranthus quitensis (Laskavec rovníkový)

oblasti: Ekvádor

Pochází z Ekvádoru.

Amaranthus retroflexus (Laskavec ohnutý)

oblasti: Alabama, Albánie, Alberta, Aljaška, Alžírsko, Andalusie, Arizona, Arkansas, Baleáry, Belgie, Bolívie, Bosna a Hercegovina, Britská Kolumbie, Bulharsko, Chorvatsko, Connecticut, Černá Hora, Česká republika, Čína, Dánsko, Delaware, Egypt, Estonsko, Florida, Francie, Georgia, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Izrael, Japonsko, Jižní Dakota, JZ Rusko, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Korsika, Kosovo, Kréta, Krym, Kypr, Libye, Litva, Lotyšsko, Louisiana, Lucembursko, Maďarsko, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Moldávie, Mongolsko, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nizozemí, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Polsko, Portugalsko, Quebec, Rakousko, Řecko, Rhode Island, Rumunsko, S Jižní Amerika, S Mexiko, Sardínie, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Sicílie, Sinajský poloostrov, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Střední Amerika, SZ Rusko, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Tunisko, Turecko, Utah, Velká Británie, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Z Rusko, Západní Virginie

Pochází z tropické Ameriky. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky (0,1 -) 0,3 - 0,75 (i 2 - 3)m. Lodyha je od báze do střední části větvená a hustě krátce ochlupená. Listy jsou vejčité, dlouhé (1 -) 5 - 11 (i 15)cm, široké (0,6 -) 3 - 6cm a řapíky jsou dlouhé do 6cm. Květy červenými nebo zelenými květy v husté kuželovité ocasovité latě. Květy jsou dále seskupené do klubíček. Plodem je jednosemenná tobolka velikosti 2mm a obsahuje černé zploštělé semeno velikosti 1mm.

Vyhovují mu pole, okraje cest, skládky, plevel v okopaninách, atp. Může růst i v mírně zasolených půdách.

Množí se semeny.

Amaranthus rosengurtii

Amaranthus roxburghianus

Amaranthus rudis (Laskavec tamaryškový)

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Manitoba, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Severní Dakota, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Vermont, Washington, Wisconsin, Západní Virginie

Pochází ze Severní Ameriky. Listy mají dlouze kopinatý tvar. Listence mají délku 2mm.

Amaranthus scandens

Amaranthus scariosus

Amaranthus schinzianus

Amaranthus scleranthoides

Amaranthus scleropoides

oblasti: Oklahoma, Texas

Amaranthus sparganicephalus

Amaranthus spinosus

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Havajské ostrovy, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pákistán, Pennsylvania, Portoriko, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste v tropické Americe jako jednoletka. Dorůstá výšky do 1,5m. Stonek může být větvený a občas je načervenalý. Listy jsou vejčité až eliptické nebo kopinaté, dlouhé 1,5 - 12cm, široké 0,8 - 6cm a řapík je dlouhý do 9cm. Květenstvím je hrozen o průměru 0,6 - 1,5cm a vlastní květy jsou zelené. Plodem je kulovitá tobolka velikosti 1,5mm a obsahuje zploštělé černé semeno velikosti 0,75 - 1mm.

Amaranthus squamulatus

Amaranthus standleyanus

Amaranthus tamariscinus

Amaranthus tamaulipensis

Amaranthus tenuifolius

oblasti: Indie, Pákistán

Pochází z Indie a Pakistánu. Roste jako jednoletka. Dorůstá výšky (3 -) 8 - 35cm. Stonek je od báze bohatě větvený, žlutozelený až načervenalý. Listy jsou úzce podlouhlé až úzce obkopinaté, dlouhé 0,8 - 3,2cm a široké 2 - 5mm. Květenství má průměr do 8mm, vlastní květy jsou zelené, samčí i samičí promíchané anebo samčí soustředěné na vrcholu. Plodem je eliptická mírně zploštělá tobolka velikosti 1,25mm a obsahuje kulaté zploštělé semeno velikosti 0,8mm.

Amaranthus thellungianus

Amaranthus thunbergii

oblasti: Afrika, Jižní Karolína

Pochází z Afriky.

Amaranthus torreyi

oblasti: Arizona, Kalifornie, Makaronésie

Pochází z jihozápadu USA a severního Mexika.

Amaranthus tricolor (Laskavec trojbarevný)

oblasti: Afrika, Čína, Francie, Indie, Indonésie, Itálie, Japonsko, Louisiana, Melanésie, Michigan, Mississippi, Missouri, Nová Guinea, Pákistán, Portoriko, Sicílie, Tichý oceán, Turecko

Pochází z oblasti od Indie po Čínu a Japonsko, rozšířil se ale i v jihovýchodní Asii, Pacifiku, Americe a Africe. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 1,25m. Stonek je vystoupavý a zpravidla bohatě větvený. Listy bývají používány domorodci v Africe pro výrobu salátu, jsou obarvené do kombinací zelené, žluté a červené, tvar je vejčitý, dlouze špičatý a řapíky je dlouhý do 8cm. Květenství má průměr 0,4 - 2,5cm, plodem je tobolka velikosti 2,25 - 2,75mm obsahující černé nebo hnědé semeno velikosti 1 - 1,5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Aurora'
- 'Early Splendour'
- 'Flaming Fountain' - listy na bázi rostliny tmavězelené, později s bronzovým nádechem, v horní části červené
- 'Illumination' - výška 50 - 70cm
- 'Joseph's Coat' - listy jasně bronzově, oranžově a červeně panašované, dlouhé 20cm
- var. rubriviridis
- f. ruber
- f. splendens

Amaranthus tuberculatus (Laskavec tamaryškový)

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Manitoba, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Severní Dakota, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Vermont, Washington, Wisconsin, Západní Virginie

Patří mezi jednoletky. Pochází z USA.

Amaranthus tucsonensis

Amaranthus urceolatus

Amaranthus venulosus

oblasti: Arizona

Amaranthus viridis (Laskavec zelený)

synonyma: A. gracilis

oblasti: Alabama, Albánie, Andalusie, Arizona, Arkansas, Bělorusko, Egypt, Florida, Francie, Georgia, Havajské ostrovy, Indie, Itálie, Izrael, Jižní Karolína, Katalánsko, Korsika, Kréta, Kypr, Libye, Louisiana, Maroko, Massachusetts, Michigan, Mississippi, New York, Nové Mexiko, Oklahoma, Pákistán, Pennsylvania, Portugalsko, Řecko, S Jižní Amerika, Sardínie, Severní Karolína, Sicílie, Sinajský poloostrov, Slovensko, Střední Amerika, Švédsko, Tennessee, Texas, Tunisko, Turecko, Virginie

Pochází z tropické Ameriky. Dorůstá výšky (0,1 -) 0,2 - 0,75 (i 1)m. Stonek je vzpřímený nebo vystoupavý. Listy jsou 3úhle vejčité až podlouhlé, dlouhé 2 - 7cm, široké 1,5 - 5,5cm a mají až 10cm řapík. Květenstvím je klas délky 2,5 - 12cm, průměru 7mm a je načervenalý. Plodem je kulovitá tobolka velikosti 1,25 - 1,5mm obsahující kulaté semeno velikosti 1 - 1,25mm. V Indii a Africe je využíván v kulinářství.

Amaranthus vulgarissimus

Amaranthus watsonii

oblasti: Arizona, Kalifornie

Pochází z jihozápadu USA a severního Mexika. Listy mají oválný tvar, délku 8cm.

Vyhovují mu písčité místa v poušti.

Amaranthus wrightii

oblasti: Arizona, Kolorado, Nové Mexiko, Texas, Utah

Amaranthus x adulterinus

Amaranthus x alleizettei

Amaranthus x budensis

Amaranthus x ozanonii

Amaranthus x soproniensis

Amaranthus x texensis

oblasti: Texas

Amaranthus x tucsonensis

oblasti: Arizona

Amaranthus x turicensis

Další informace:

<http://botanika.wendys.cz/kytky/K670.php>

<http://botany.cz/cs/amaranthus-retroflexus/>

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Laskavec>

<http://kvetiny.atlasrostlin.cz/laskavec-ocasaty>

<http://www.celysvet.cz/laskavec-.php>

<http://www.garten.cz/a/cz/547-amaranthus-laskavec/>

<https://www.rostliny.net/>