

Amaranthus hybridus (Laskavec rozkladitý)

synonyma: *Amaranthus patulus*

čeleď: *Amaranthaceae*

oblasti: Alabama, Albánie, Alžírsko, Andalusie, Arizona, Arkansas, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Connecticut, Delaware, Egypt, Florida, Francie, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Korsika, Kréta, Kypr, Libye, Louisiana, Maďarsko, Maine, Makaronésie, Manitoba, Maroko, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nizozemí, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Polsko, Portugalsko, Quebec, Řecko, Rhode Island, Rumunsko, Sardínie, Severní Dakota, Severní Karolína, Sicílie, Sinajský poloostrov, Slovinsko, Srbsko, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Tunisko, Turecko, Velká Británie, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Západní Virginie

Pochází ze Severní Ameriky. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 0,2 - 1 (i 3)m. Stonek je větvený. Listy dlouhé 3 - 19 (i 30)cm, široké 1,5 - 8 (i 12)cm a řapíky jsou dlouhé do 15cm. Květenstvím je vrcholový klas nebo hrozen délky do 45cm a šířky 25cm, samčí i samičí květy jsou rozmístěné promíchaně, barva je nejprve zelená, přechází do žluté a končí u červené. Plody mají velikost 2 - 3mm a obsahují černá zploštělá semena velikosti 0,75 - 1,25mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *bouchonii*
- subsp. *cruentus*
- subsp. *hybridus* (Laskavec rozkladitý pravý)
- subsp. *hypochondriacus*
- subsp. *quitensis*

Vyskytuje se na březích, skládkách, rumišťích, atp.

<https://www.rostliny.net/>