

Thottea corymbosa

synonyma: *Apama corymbosa*, *Asiphonia piperiformis*, *Bragantia corymbosa*, *Bragantia melastomaefolia*, *Strakaea melastomaefolia*

čeleď: Aristolochiaceae

oblasti: Borneo, Malajský poloostrov

Roste na Malajském poloostrově a Borneu v podobě keře, který může být i šplhavý. Dorůstá výšky do 5m. Větve jsou drobně ochlupené. Listy jsou až prakticky kožovité, vejčité, kopinaté, či eliptické (i obvejčité), špičaté, dlouhé 6,5 - 17,5cm, široké 2,5 - 8,5cm, báze klínovitá či tupá, na spodní straně řídce ochlupená, žilnatinu tvoří až 3 páry žilek a řapíky jsou dlouhé do 8mm. Květenství je terminální nebo úžlabní, latnaté či chocholičnaté, dlouhé do 10cm, jemně ochlupené, listeny dlouhé do 8mm, vlastní květy mají 0,7 - 2cm stopku, obal ochlupený, žlutý, nazelenalý či béžový, uvnitř růžovofialový délky 3 - 4mm, průměru do 7mm, laloky prakticky kulaté, dlouhé 2,5 - 3mm a široké 2,5 - 3,5mm. Plodem je 4hranná mírně zkroucená a mírně ochlupená tobolka délky do 38cm obsahující semena délky 4 - 6mm a šířky 2,5 - 3,5mm.

<https://www.rostliny.net/>