

Cheiridopsis

čeleď: Aizoaceae

Roste v JAR a Namibii. Listy má dvojí, první vytvářejí pochvu pro druhý pár, který je sukulentně ztlustlý a zpravidla kýlovitý. Kvete bílými, žlutými nebo růžovými květy o průměru až 6cm.

Vyžaduje plné slunce, dobře propustnou půdu, v době vegetace pravidelnou zálivku (po vyschnutí substrátu), mimo vegetaci se omezí. Zimuje při teplotě do 5°C (údajně některé vydrží v naprostém suchu u -4°C).

Množí se semeny nebo dělením.

Cheiridopsis acuminata

synonyma: *C. carinata*

Cheiridopsis albirosa

Cheiridopsis amabilis

Cheiridopsis aspera

Cheiridopsis brownii

synonyma: *C. graessneri*, *C. hallii*, *C. insignis*, *C. pachyphylla*, *C. schlechteri*, *C. staminodifera*, *C. turgida*

Cheiridopsis campanulata

Cheiridopsis caroli-schmidtii

synonyma: *C. ausensis*, *C. borealis*

Cheiridopsis delphinoides

Cheiridopsis denticulata

synonyma: *C. candidissima*, *C. denticulata* var. *glauca*, *C. inconspicua*, *C. littlewoodii*, *C. macrophylla*, *C. vanheerdei*

oblasti: Severní Kapsko

Roste v JAR v podobě sukulentního polokeře. Dorůstá výšky 5 - 15cm. Lodyhu nevytváří. Listy jsou sivozelené, šídlovitě 3řízné, zploštělé, na konci jemně zubaté. Květní stvol má 2 listeny, vlastní květ je jediný v barvě žluté.

Vyhovují mu chudé suché písčité půdy a plné slunce.

Množí se semeny.

Cheiridopsis derenbergiana

synonyma: *C. albiflora*, *C. altitecta*, *C. ampliata*, *C. angustipetala*, *C. citrina*, *C. compressa*, *C. eburnea*

Cheiridopsis gamoepensis

oblasti: Namaqualand

Roste v USA v kompaktním habitu. Listy jsou párovité, masité a hnědofialové. Kvete žlutými květy. Plodem je tobolka na krátké stopce, má 10 pouzder, ve spodní 3/4 je kulovitá a obsahuje hnědá mírně hrbolkatá semena.

Vyhovuje mu suché žulové nebo křemenné podloží.

Množí se semeny nebo řízky.

Cheiridopsis glomerata

Cheiridopsis herrei

Cheiridopsis imitans

oblasti: Namaqualand

Roste v JAR v kompaktním trsu o průměru 10 - 20cm. Listy jsou ztlustlé, špičaté, v době vegetace dlouhé, srostlé pouze na bázi, v době sucha mají 1/3 délku, jsou hnědočervené a téměř celé srostlé. Kvete žlutými květy o průměru do 5cm.

Vyhovuje mu dobře propustný substrát.

Množí se semeny.

Cheiridopsis meyeri

Cheiridopsis minor

synonyma: *C. meyeri* var. *minor*

Cheiridopsis namaquensis

synonyma: *C. breachiae*, *C. brevis*, *C. brevissima*, *C. cigarettifera*, *C. curta*, *C. difformis*, *C. duplessii*, *C. framesii*, *C. hutchinsonii*, *C. intrusa*, *C. latifolia*, *C. longipes*, *C. luckhoffii*, *C. marlothii*, *C. quaternifolia*, *C. scabra*, *C. scabra* var. *fera*, *C. serrulata*, *C. subalba*, *C. tenuifolia*

oblasti: Severní Kapsko, Západní Kapsko

Roste v JAR v podobě sukulentního polokeře. Dorůstá výšky 2 - 5cm. Lodyha je zakrnělá a větvená. Listy jsou ztlustlé, bíle tečkované, špičaté, kýlovitě 3hranné a na vrcholu mají nevýrazný kanálek. Kvete žlutými květy na stopce s korunními lístky o délce 1,2 - 1,8cm. Vyhovují mu chudé suché písčité půdy a plné slunce.

Množí se semeny.

Cheiridopsis nelii

Cheiridopsis pearsonii

synonyma: *C. glabra*

Cheiridopsis peculiaris

Cheiridopsis pillansii

synonyma: *C. crassa*, *C. gibbosa*, *C. pillansii* var. *crassa*

oblasti: Kapsko

Roste v JAR v trsech. Dorůstá výšky 8cm a šířky 15cm. Listy jsou párovité, krátké, kýlnaté, tupě špičaté, dlouhé 4cm, z 1/2 srostlé, sivozelené a v mládí namodralé. Kvete světležlutými květy.

Cheiridopsis pilosula

Cheiridopsis ponderosa

Cheiridopsis purpurata

Cheiridopsis purpurea

synonyma: *C. splendens*

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR)

Roste v JAR. Dorůstá výšky do 35cm a šířky 45cm. Listy jsou světle modrozelené, narůžovělé a dlouhé 7cm. Kvete růžovofialovými květy o průměru 5cm.

Cheiridopsis robusta

synonyma: *C. alata*, *C. aurea*, *C. aurea* var. *lutea*, *C. brevipes*, *C. brevis*, *C. grandiflora*, *C. lecta*, *C. leptopetala*, *C. multiseriata*, *C. olivacea*, *C. perdecora*, *C. pressa*, *C. roodiae*, *C. schickiana*, *C. truncata*

oblasti: Namibie, Severní Kapsko

Roste v JAR a Namibii. Lodyha je silná, zakrnělá, poléhavá a větvená. Listy jsou ztlustlé, šídlovité, tupé, tečkované a u báze bradavičnaté. Kvete samostatnými žlutými květy.

Vyhovují mu chudé suché písčité půdy a plné slunce.

Množí se semeny.

Cheiridopsis rostrata

synonyma: *C. bibracteata*, *C. bifida*, *C. carnea*, *C. inspersa*, *C. purpurascens*, *C. purpurascens* var. *leipoldtii*, *C. quadrifida*, *C. rostratoides*, *C. tuberculata*, *C. velutina*, *Mesembryanthemum tuberculatum*

oblasti: Namaqualand, Západní Kapsko

Roste v JAR v podobě polštářového porostu. Dorůstá výšky 3 - 5cm. Listy jsou ztlustlé, u báze v pochvě z 1/2 srostlé (šířka 0,8 - 1cm), tupé, částečně bradavičnaté, 3úhle kýlnaté, drobně tečkované, dlouhé 5 - 7cm. Kvete žlutými květy o průměru 5cm s 5tičetným kalichem na dlouhých stopkách.

Vyhovují mu chudé suché písčité půdy a plné slunce.

Množí se semeny.

Cheiridopsis rudis

Cheiridopsis schlechteri

synonyma: *C. johannis-winkleri*, *C. paucifolia*, *C. pulverulenta*

Cheiridopsis speciosa

synonyma: *C. comptonii*

Cheiridopsis turbinata

synonyma: *C. turbinata* var. *minor*

Cheiridopsis umbrosa

Cheiridopsis umdausensis

Cheiridopsis velox

Cheiridopsis verrucosa

synonyma: C. mirabilis, C. verrucosa var. minor

Další informace:

<http://exoticke-rostliny.atlasrostlin.cz/cheiridopsis>

<http://skalnický.kadel.cz/t/kvResult.asp-Rod=Cheiridopsis.htm>

<https://www.rostliny.net/>