

Erysimum repandum (Trýzel rozkladitý)

synonyma: Cheiranthus ramosissimus, Cheirinia repanda, Crucifera repanda, Erysimum comperianum, Erysimum patens, Erysimum ramosissimum, Erysimum rigidum

čeleď: Brassicaceae

oblasti: Alabama, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Česká republika, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Jižní Dakota, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Quebec, Severní Dakota, Severní Karolína, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Utah, Virginie, Washington, Wyoming, Západní Virginie

Roste v Euroasii jako jednoletka. Dorůstá výšky (5 -) 15 - 40 (i 60)cm. Stonek je ochlupený a větvený zejména ve spodní části. Listy jsou úzké, mírně eliptické, obkopinaté, kopist'ovité anebo čárkovité, dlouhé (0,1 -) 0,15 - 0,6 (i 1)m, široké 0,2 - 1cm, horní jsou zubaté až téměř celokrajné a přisedlé. Květenstvím je 15 - 30tikvětý hrozen délky až 30cm v době plodu, vlastní květy jsou žluté, průměru 5mm, mají až 4mm stopku v době plodu, kališní lístky jsou dlouhé 4mm, korunní dlouhé 7mma široké 2mm.Plodem je šešule délky (2 -) 3 - 7 (i 9)cm, průměru (1-) 1,2 - 1,5 (i 2,3)mm a obsahuje semena mírně eliptická délky 1mm. Patří mezi chráněné druhy C1.

Vyhovují mu pole, meze, skládky, atp.

<https://www.rostliny.net/>