

Casearia javitensis

synonyma: *Casearia gaertneri*, *Casearia iquitosensis*, *C. f. congestiflora*, *C. f. cordifolia*, *C. f. grandifolia*, *C. var. integrifolia*, *Chetocrater javitensis*, *Piparea multiflora*

čeleď: Salicaceae

oblasti: Belize, Francouzská Guyana, Guatemala, Guyana, J Mexiko, Panama, Peru

Roste od střední Ameriky po sever Jižní Ameriky v podobě keře nebo stromu s rozkladitou korunou. Dorůstá výšky 10 - 15m. Borka je hnědá. Větve jsou v mládí ochlupené. Palisty jsou dlouze 3úhlé, ochlupené, dlouhé 2 - 3mm a jsou max. krátce vytrvávající. Listy jsou variabilní, kožovité, eliptické, oboustranně špičaté, hrubě pilovité až celokrajné, dlouhé 7,5 - 22 (i 30)cm, široké 3 - 8,5 (i 10)cm, žilnatinu tvoří 5 - 9 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,3 - 1,2cm. Květenstvím je 20 - 60tičetný svazek, listeny jsou dlouhé 0,5 - 1,5mm, vlastní květy mají 4 - 7mm stopku a kalich délky 3 - 5mm. Plodem je kulovitá až eliptická plstnatá tobolka délky 0,8 - 1,2cm obsahující 1 - 2 zploštělá semena velikosti 6 - 7mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *myriantha*/*C. brighami*/*C. laetioides*/*C. myriantha* - jižní Mexiko až sever Jižní Ameriky; keř nebo strom; výška do 11m při průměru kmene do 20cm; borka hladká, světlá; listy kožovité, mírně kopinaté, špičaté, drobně pilovité, dlouhé 8 - 25cm, žilnatinu tvoří 8 párů žilek a řapíky jsou krátké a tlusté; květy bílé až nazelenalé, mají až 7mm stoku, kališní lístky délky 3 - 4mm; tobolky řídce ochlupené, dlouhé 1cm, ve zralosti červené až hnědé

<https://www.rostliny.net/>