

Casearia ulmifolia

synonyma: *Casearia blanchetiana*, *Casearia cambessedesii*, *Casearia cambessedesii* var. *angustifolia*, *Casearia cambessedesii* var. *parvifolia*, *Casearia celtidifolia*, *Casearia cotticensis*, *Casearia petraea*, *Casearia reginae*, *Casearia tremifolia*, *Casearia ulmifolia*, *Guidonia ulmifolia*

čeleď: Salicaceae

oblasti: Brazílie, Venezuela

Roste od Venezuely po Brazílii v podobě stromu. Dorůstá výšky do 15m. Kmen je béžový. Větve jsou v mládí na koncích ochlupené. Palisty jsou čárkovité, dlouhé 3 - 5mm a opadávají. Listy jsou eliptické, mírně kožovité, špičaté, dlouhé 7,5 - 11cm, široké 3 - 4,5cm, báze špičatá až kulatá, spodní strana ochlupená, žilnatinu tvoří 5 - 7 párů žilek a řapíky jsou křídlaté, dlouhé 4 - 6mm. Květenstvím je krátce stopkaté klubíčko až svazek, listeny jsou dlouhé 1 - 2mm a vlastní květy mají kalich délky 2 - 3,5mm s vejčitými laloky. Plodem je tobolka délky 3 - 5,5mm obsahující 1 - 4 oranžovohnědá až hnědá semena délky 2,5 - 3mm.

<https://www.rostliny.net/>