

Cobaea (Vilec)

čeleď: Cobaeaceae

Byla pojmenována po španělském jezuitovi ze 17. století otci Cobeovi. Roste v subtropické Americe v podobě popínavé jednoletky až trvalky. Listy jsou zpeřené, kde vrcholový lístek je přeměněný v úponek. Kvete samostatnými zvonkovitými květy v barvě nazelenalé, namodralé nebo nafialovělé a opylují jej noční živočichové. Nejznámějším druhem je *C. scandens*.

Vyhovuje ji chráněné místo, plné slunce a vlhká dobře propustná půda.

Množí se semeny nebo řízky.

Cobaea lasseri

Cobaea lutea

Cobaea minor

Cobaea penduliflora

Cobaea penstemon

Cobaea scandens (Vilec šplhavý)

synonyma: *Rosenbergia*

oblasti: Střední Amerika, Veracruz

Roste v Mexiku v podobě trvalky a popínavé liány dorůstající délky 3,5 - 4,5 (i 20)m. Roční přírůstky mohou být i 3 - 8m. Střídavé listy jsou husté, zpeřené, mají 2 - 3 páry eliptických zašpičatělých lístků dlouhých 3,5 - 13cm a širokých 1,5 - 6cm. Kvete tmavými růžovofialovými žilnatými zvonovými květy s délkou kalicha 2,5 - 3,5cm a průměrem 4,5 - 6,5cm. Plody jsou eliptické, drobně ochlupené a dlouhé 5 - 9cm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Alba' - květy bílé, později světle béžové

Vyhovuje je teplo, plné slunce, chráněné místo a dobře propustná půda bohatá na živiny. Snáší chladno, ne mráz.

Množí se semeny brzy na jaře. V květnu se mohou semenáčky přemístit ven.

Další informace:

<http://www.garten.cz/a/cz/3446-cobaea-scandens-vilec-splhavy/>

<http://www.pelargonie.cz/cobaea.html>

<http://www.popinave-rostliny.cz/cobaea-vilec/>

<https://www.rostliny.net/>