

Amsinckia

čeleď: Boraginaceae

Amsinckia calycina

synonyma: *A. angustifolia*, *A. angustifolia* var. *microcarpa*, *A. angustifolia* var. *pseudolycoptoides*, *A. aurantiaca*, *A. australis*, *A. basistaminea*, *A. hispida*, *A. humifusa*, *A. patagonica*, *A. pseudolycoptoides*, *Benthamia angustifolia*, *Benthamia basistaminea*, *Benthamia hispida*, *Cryptantha spegazzinii*, *Eritrichium pachnophilum*, *Lithospermum calycinum*, *Plagiobothrys aurantiacus*

Amsinckia carinata

oblasti: Washington

Roste v USA jako jednoletka. Dorůstá výšky 10 - 30cm. Povrch je ochlupený. Listy jsou kopinaté, dlouhé do 8cm a ochlupené. Kvete žlutooranžovými květy o velikosti 1cm. Plodem je tmavěšedá tvrdka.

Amsinckia douglasiana

synonyma: *A. interior*, *A. lemmonii*, *A. macrantha*, *A. tessellata* var. *lemmonii*

oblasti: Kalifornie, Maine

Roste v USA jako jednoletka. Kvete žlutooranžovými květy o průměru více než 1cm a mají zpravidla méně než 5 laloků.

Amsinckia eastwoodiae

synonyma: *A. douglasiana* var. *eastwoodiae*, *A. intermedia* var. *eastwoodiae*, *A. johnstonii*, *A. jonesii*, *A. jucunda*, *A. obvallata*, *A. splendens*, *A. stenophylla*, *A. valens*, *A. verna*

oblasti: Kalifornie, Massachusetts

Roste v USA jako jednoletka. Kvete žlutooranžovými 5tilaločnými trubkovitými květy délky do 2cm a průměru 1,5cm.

Amsinckia grandiflora

synonyma: *A. vernicosa* var. *grandiflora*

oblasti: Kalifornie

Roste v USA. Kvete žlutooranžovými trubkovitými 5tilaločnými květy v několikačetných svazcích.

Amsinckia inepta

Amsinckia lunaris

synonyma: *A. anomala*, *A. cinerea*, *A. disjuncta*, *A. longifolia*, *A. papillata*, *A. yosemitensis*

oblasti: Kalifornie

Roste v USA jako jednoletka. Kvete trubkovitými květy délky 1cm a průměru méně než 1cm.

Amsinckia lycopsoides

synonyma: *Benthamia lycopsoides*

oblasti: Aljaška, Austrálie, Britská Kolumbie, Connecticut, Idaho, Illinois, Kalifornie, Kolorado, Massachusetts, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, New York, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Severní Dakota, Texas, Utah, Washington, Wisconsin, Wyoming

Roste v USA a Kanadě jako jednoletka. Zavlečená byla do Austrálie. Stonek je max. řídce větvený. Povrch je ochlupený. Listy jsou střídavé kopinaté, špičaté a ochlupené. Kvete žlutými trubkovitými 5tičetnými květy o délce i šířce 1cm.

Amsinckia mandonii

synonyma: *Eritrichium mandonii*

Amsinckia marginata

oblasti: Ekvádor

Roste v Ekvádoru.

Amsinckia menziesii

synonyma: *A. copelandii*, *A. douglasiana* var. *interior*, *A. eatonii*, *A. helleri*, *A. hirticaulis*, *A. hispidissima*, *A. menziesii* f. *angustisepala*, *A. menziesii* f. *latisepala*, *A. menziesii* var. *microcarya*, *A. menziesii* var. *retrorsa*, *A. micrantha*, *A. parviflora*, *A. retrorsa*, *A. sparsiflora*, *Benthamia menziesii*, *Benthamia micrantha*, *Benthamia parviflora*, *Benthamia retrorsa*

oblasti: Alberta, Aljaška, Arizona, Britská Kolumbie, Connecticut, Idaho, Illinois, Jižní Karolína, Kalifornie, Kolorado, Maine, Manitoba, Massachusetts, Mexiko, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New York, Nový Jižní Wales, Oregon, Pennsylvania, Queensland, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Texas, Utah, Virginie, Washington, Wyoming, Yukon

Roste v Mexiku, USA a Kanadě. Zavlečená byla do Austrálie. Kvete žlutooranžovými trubkovými květy. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *intermedia*
- var. *menziesii*

Množí se semeny.

Amsinckia spectabilis

synonyma: *A. acuminata*, *A. celsa*, *A. constricta*, *A. davyi*, *A. dimorpha*, *A. divaricata*, *A. fulgens*, *A. granulosa*, *A. inflatula*, *A. intermedia* var. *saint-nicolai*, *A. intermedia* var. *sancti-nicolai*, *A. kelloggii*, *A. latifolia*, *A. leptosperma*, *A. littoralis*, *A. lycopsoides* var. *bracteosa*, *A. maculata*, *A. maritima*, *A. mathewsii*, *A. microsperma*, *A. nigricans*, *A. oblongifolia*, *A. ovata*, *A. saint-nicolai*, *A. scouleri*, *A. spectabilis* var. *bracteosa*, *A. spectabilis* var. *nicolai*, *A. spectabilis* var. *saint-nicolai*, *A. spectabilis* var. *sancti-nicolai*, *A. truncata*, *Benthamia maritima*, *Benthamia sancti-nicolai*, *Benthamia spectabilis*, *Lithospermum lycopsoides*

oblasti: Britská Kolumbie, Illinois, Kalifornie, Oregon, Washington

Roste v USA a Kanadě jako jednoletky. Listy jsou celokrajné nebo zubaté. Květenstvím je jednostranné, tvořené žlutými trubkovitými květy o délce do 2cm a průměru 1,5cm.

Vyhovují jí písčité půdy.

Amsinckia tessellata

synonyma: *A. brachysantha*, *A. collina*, *A. conica*, *A. deltoidea*, *A. douglasiana* var. *elegans*, *A. dudleyi*, *A. elegans*, *A. macrosepala*, *A. marginata*, *A. mojavensis*, *A. obliqua*, *A. ovaticarpa*, *A. platycarpa*, *A. pustulata*, *A. remotifructis*, *A. rostellata*, *A. salebrosa*, *A. subintegra*, *A. tessellata* var. *elegans*, *A. tessellata* var. *macrosepala*, *A. turrita*, *Benthamia collina*, *Benthamia pustulata*, *Benthamia tessellata*

oblasti: Arizona, Britská Kolumbie, Idaho, Kalifornie, Kalifornský záliv, Missouri, Nevada, Nové Mexiko, Oregon, Sonora, Utah, Washington

Roste v Mexiku, USA a Kanadě. Kvete žlutými trubkovitými 5tilaločnými květy průměru do 1cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *gloriosa*
- var. *tessellata*

Amsinckia vernicosa

synonyma: *A. carnososa*, *A. glauca*, *Benthamia carnososa*, *Benthamia vernicosa*

oblasti: Kalifornie

Roste v USA jako jednoletka. Květenství tvoří žlutooranžové trubkovité květy délky do 2cm a průměru 1,5cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *furcata*
- var. *vernicosa*

<https://www.rostliny.net/>