

Heliotropium curassavicum

synonyma: Coldenia succulenta, H. var. violaceum, Heliotropium lehmannianum

čeleď: Boraginaceae

oblasti: Alabama, Alberta, Arizona, Arkansas, Austrálie, Delaware, Florida, Georgia, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Indie, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kolorado, Louisiana, Maine, Makaronésie, Manitoba, Maryland, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Oklahoma, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Portoriko, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Střední středozemí, Texas, Utah, Virginie, Washington, Wyoming

Roste po celé Severní Americe, Evropě, Africe, v Pakistánu, Indii a Austrálii jako trvalka. Dorůstá výšky do 45 (i 50)cm. Stonek i větve jsou poléhavé. Listy jsou úzce obkopinaté, dlouhé 1,5 - 3,5 (i 4)cm, široké 4 - 8mm. Květenství je vrcholové, dlouhé 3 - 6cm, vlastní květy jsou 5tičetné, kalich je až k bázi rozeklaný, dlouhý 1,5mm, laloky jsou vejčitě kopinaté, dlouhé 0,9 - 1,5mm, koruna je bílá, má v průměru 1 - 1,5mm, trubka má délku 1,7mm a laloky jsou dlouhé 1mm. Plodem je tvrdka délky 1,7 - 2mm a šířky 0,9 - 1,4mm.

Dokáže růst i v zasolené půdě.

<https://www.rostliny.net/>