

Ocotea puberula

synonyma: *Gymnobalanus perseoides*, *Laurus puberula*, *Myrcia schaueriana*, *Myrtus dioica*, *Ocotea arechavaletae*, *Ocotea martiniana*, *O. var. arechavaletae*, *Ocotea pyramidata*, *Ocotea subglabra*, *Oreodaphne acutifolia* var. *latifolia*, *Oreodaphne hostmanniana*, *Oreodaphne martiniana*, *Oreodaphne martiniana* var. *dubia*, *Oreodaphne martiniana* var. *latifolia*, *Oreodaphne martiniana* var. *opaca*, *Persea richardiana*, *Strychnodaphne puberula*

čeleď: Lauraceae

oblasti: Argentina, Brazílie, Francouzská Guyana, Guyana, Mexiko, Paraguay, Peru, Surinam

Roste od Mexika po Argentinu v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 7 - 27m při průměru kmene do 50cm. Borka je šedá. Listy mohou být prakticky kožovité, eliptické, špičaté, mohou být lesklé, dlouhé 15 - 21cm, široké 2,5 - 8cm, báze špičatá až tupá, žilnatinu tvoří 5 - 9 párů žilek a řapíky jsou dlouhé do 3cm. Květenství je bohaté, jehlanovité, vlastní květy jsou jednopohlavné, dvoudomé, samčí dlouhé 3 - 5mm, laloky dlouhé 2 - 2,7mm, široké 1,7 - 2,2mm a samičí květy dlouhé 2 - 3mm. Plodem je kulovitá černá bobule o průměru 6 - 8mm.

<https://www.rostliny.net/>