

Crypsis alopecuroides (Bahenka psárkovitá)

synonyma: *Agrostis brachystachys*, *Alopecurus fulvus*, *Alopecurus geniculatus*, *Chilochloa explicata*, *Crypsis aegyptiaca*, *Crypsis alopecuroides*, *C. subsp. brachystachys*, *C. var. celakovskyi*, *C. var. nigricans*, *C. var. sicula*, *Crypsis brachystachys*, *Crypsis explicata*, *Crypsis geniculata*, *Crypsis macrostachya*, *Crypsis nigricans*, *Crypsis phalaroides*, *Crypsis schoenoides*, *Crypsis sicula*, *Crypsis tenuissima*, *Heleochloa alopecuroides*, *Heleochloa alopecuroides f. subvaginata*, *Heleochloa alopecuroides var. celakovskyi*, *Heleochloa alopecuroides var. nigricans*, *Heleochloa brachystachys*, *Heleochloa explicata*, *Heleochloa nigricans*, *Phalaris explicata*, *Phalaris geniculata*, *Phleum alopecuroides*, *Vilfa brachystachys*

čeleď: Poaceae

oblasti: Česká republika, Idaho, Írán, Kalifornie, Kolorado, Nevada, Oregon, Pennsylvania, Utah, Washington, Wyoming

Dorůstá výšky 5 - 30cm. Nejvyšší list je kratší než nepatrně nafouklé pochva. Květenstvím je válcovitý lichoklas délky 2 - 6cm a šířky 4 - 6mm.

Vyhovují ji obnažené břehy, slaniska a vlhké úhory.

<https://www.rostliny.net/>