

Carthamus lanatus (Světlíce vlnatá)

synonyma: Anactis pilosa, Atractylis fusus-agrestis, Atractylis lanata, Atractylis leucocephala, Atractylis lutea, Atractylis pilosa, Calcitrapa lanuginosa, Carduncellus lanatus, Carduus attractylis, Carthamus albus, Carthamus elatus, Carthamus exsuccus, C. var. abyssinicus, C. var. algeriensis, C. var. divaricatus, C. var. longifolius, Carthamus macedonicus, Carthamus tauricus, Carthamus turbinatus, Centaurea lanata, Kentrophyllum elatum, Kentrophyllum lanatum, Kentrophyllum lanatum var. abyssinicum, Kentrophyllum tauricum, Kentrophyllum turbinatum

čeleď: Asteraceae

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Arizona, Arménie, Ázerbájdžán, Baleáry, Bosna a Hercegovina, Britská Kolumbie, Bulharsko, Chorvatsko, Černá Hora, Egypt, Francie, Gruzie, Írán, Itálie, Jižní Karolína, JZ Rusko, Kalifornie, Katalánsko, Kazachstán, Korsika, Krym, Kypr, Libye, Maďarsko, Makaronésie, Makedonie, Maroko, Massachusetts, Moldávie, Oklahoma, Oregon, Portugalsko, Řecko, Rumunsko, Sardínie, Sicílie, Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko, Texas, Tunisko, Turecko, Ukrajina

Roste ve středozemí (především v severní části) až střední Asii. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 0,1 - 0,6 (i 2)m. Lodyhy jsou pavučinatě ochlupené. Listy jsou hluboce laločnaté, peřenoklané až peřenosečné, ostnitě a žláznatě tečkované. Kvete žlutými květy v úborech. Plodem je 4 - 5mm dlouhá 4hranná hnědá nažka zpravidla se štětinovitým chmýrem délky 1 - 1,3cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. montanus
- subsp. turkestanicus

Vyhovují mu suché louky.

<https://www.rostliny.net/>