

Palicourea guianensis

synonyma: *Nonatelia cataractarum*, *Palicourea barbinervia*, *P. f. glabra*, *P. subsp. barbinervia*, *P. subsp. occidentalis*, *P. var. glabrescens*, *P. var. tetramera*, *P. var. trimera*, *Palicourea sprucei*, *Psychotria cataractarum*, *Psychotria guianensis*, *Psychotria lutea*, *Psychotria palicourea*, *Simira palicourea*, *Stephanium guianense*, *Uragoga barbinervia*, *Uragoga palicourea*

čeleď: Rubiaceae

oblasti: Brazílie, Portoriko, Venezuela

Roste od střední Ameriky a Karibiku po sever Jižní Ameriky v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 2 - 10m. Kmínky jsou 4hranné až kulaté, široké 1,5 - 8mm a mohou být ochlupené. Palisty jsou 2dílné, kopinaté, tupé. Listy jsou vstřícné, vejčité až eliptické, špičaté, mohou být řídce ochlupené, dlouhé 12 - 30cm, široké 5 - 18cm, báze špičatá až prakticky kulatá a žilnatinu tvoří 10 - 15 párů žilek. Květenství je kyticovitá či chocholičnatá lata délky 7 - 18cm, šířky 4 - 12cm v barvě žluté až oranžové či červenooranžové, má 3 - 12cm stopku, listeny chybí nebo jsou drobné, šídlovité, kališní laloky malé, 3úhlé, tupé či špičaté, korunní trubka dlouhá 0,8 - 1,2cm, laloky dlouhé 1 - 2mm a 3úhlé. Plody jsou růžovofialové, vejčité až eliptické a dlouhé 4 - 7mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. *barbinervia* - Venezuela, Brazílie; žilky ochlupené; korunní trubka v jícnu ochlupená

<https://www.rostliny.net/>