

Cyperus difformis

synonyma: *Cyperus lateriflorus*

čeleď: Cyperaceae

oblasti: Afrika, Alabama, Andalusie, Arizona, Austrálie, Delaware, Florida, Georgia, Havajské ostrovy, Idaho, Indie, Irák, J Evropa, Jižní Amerika, Jižní Karolína, Kalifornie, Katalánsko, Kavkaz, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Nebraska, New Jersey, Oklahoma, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Portoriko, Severní Karolína, Tádžikistán, Tennessee, Texas, Turecko, Uzbekistán, Virginie, Washington

Vyskytuje se v jižní Evropě, dále až po Indii, v Africe, Austrálii a byl také zavlečen do Severní i Jižní Ameriky. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 20 - 50 (i 70)cm. Stonek je ostře 3hranný a má v průměru 3mm. Listy jsou kýlnaté, dlouhé do 50cm, široké 3 - 5mm, pochva je zelená až žlutohnědá, občas s načervenalými tečkami a dlouhá 10cm. Květenství tvoří 1 - 7 kulovitých částí na max. 3cm stopce, v průměru má 0,7 - 1,5cm, má 2 - 3 listeny délky do 20cm, klásky jsou 5 - 20tkvěté, dlouhé 2 - 5mm a široké 1mm. Plody jsou ostře 3hranné, ochlupené, nažloutlé a velikosti 0,5mm.

Patří mezi vodomilné druhy.

<https://www.rostliny.net/>