

Aeginetia

synonyma: Gasparinia, Phelypea, Tsiam-cumula

čeleď: Orobanchaceae

Nejznámějším druhem je *A. indica*.

Aeginetia indica

synonyma: *A. aeginetia*, *A. boninensis*, *A. indica* var. *gracilis*, *A. japonica*, *A. mairei*, *Orobanche aeginetia*, *Phelipaea indica*

oblasti: Indie, Nová Guinea, Thajsko

Roste v tropická Asii. Patří mezi jednoleté parazitické nezelené rostliny. Plodem je tobolka. Kořeny a květy se používají v medicíně.

Parazituje na tropické trávě *Setaria palmifolia* (Bér palmolistý), dále může využívat rýže seté, cukrové třtiny, kukuřice a některých bambusů.

Aeginetia mirabilis

synonyma: *A. centronia*, *Centronota mirabilis*, *Gasparinia mirabilis*

Aeginetia pedunculata

synonyma: *A. abbreviata*, *A. acaulis*, *A. saccharicola*, *A. trimenii*, *Orobanche acaulis*, *Orobanche pedunculata*

oblasti: Himálaj, Indie, Indonésie, Kambodža, Malajsie, Pákistán

Roste od Himálaje po Indonésii. Dorůstá výšky do 15cm. Květy mají 2 - 10cm stopku, kalich délky 3 - 5cm v barvě růžové až bělavé, koruna má délku 6 - 7,5cm, šířku 5cm a je žlutobílá s růžovofialovými laloky. Plody mají v průměru 2cm a obsahují malá hnědá semena.

Aeginetia selebica

Aeginetia sessilis

Aeginetia sinensis

synonyma: *A. indica* f. *japonica*

<https://www.rostliny.net/>