Spondias (Mombín)

čeleď: Anacardiaceae

Existuje 17 druhů. 7 z nich pochází z neotropů a zbývající z tropické Asie. 10 druhů je jedlých. Jsou vzdáleně příbuzné jabloním a slivoním. Patří mezi opadavé nebo poloopadavé stromy. Dorůstají výšky až 25m. Listy vyrůstají ve spirále, jsou lichozpeřené, zřídka i 2x. Plodem je peckovice podobná malému mangu, dlouhá 4 - 10cm, s dužinou žlutou až oranžovou. Obsahuje jediné semeno.

Spondias cytherea

Listy jsou lichozpeřené, tmavězelené lesklé barvy. Kvete v latách na koncích větví.

Spondias dulcis

oblasti: Melanésie, Portoriko, Tichý oceán

Roste v Melanésii a Polynésii. Patří mezi tropické stromy plodící jedlé plody. V domovině dorůstá výšky až 18m a růst je rychlý. Obvykle však končí při 9 - 12m. Listy má opadavé, lesklé, zpeřené, dlouhé 20 - 60cm a tovří jej 9 - 25 eliptických nebo obvejčitých lístků dlouhých 6 - 10cm s lehce přehlédnutelným pilovým okrajem. Kvete bílými samčími nebo samičími květy v latech. Plod je oválný, dlouhý 6 - 9cm a tvoří se ve skupinách po 12ti nebo i více. Na zem padá ještě zelené s bílou dužinou. Teprve pak dozrává do zlatožluté barvy.

Spondias haplophylla

Spondias indica

oblasti: Indie, Střední Asie

Spondias lakonensis

Spondias mombin (Mombín žlutý)

oblasti: Portoriko

Pochází z tropické Ameriky, včetně Západní Indie. Dorůstá výšky až 30m a listy jsou opadavé. Patří mezi jednodomé rostliny. Vstřícně vyrůstající listy jsou lichozpeřené, dlouhé až 50cm. Vlastních lístků na něm může být 5 - 19, mají oválněkopinatý tvar, délku 5 - 15cm, ostrou špičku a lesklý povrch. Kvete po jejich opadání bělavými květy v latách dlouhých i 35cm. Plody mají kožovitý povrch, žlutooranžovou barvu a velikosti 3 - 4cm. Řadí se mezi peckovice, ale nelze je dlouho skladovat. Slupka je pouze tenká, dužina oranžová a skladkokyselá. Semeno obsahuje téměř z 1/3 olej. Dokáže plodit i 2x ročně.

Vyhovuje mu teplo a vlhko.

Množí se semeny nebo řízky.

Spondias pinnata

Spondias purpurea (Mombín červený)

oblasti: Florida, Portoriko

Pochází z tropů Ameriky. Patří mezi střední stromy. Dorůstá výšky až 10 - 25m. Vstřícně vyrůstající listy má opadavé, dlouhé až 25cm, tmavězelené lesklé barvy, lichozpeřené, složené z 7 - 23 kopinatých lístků dlouhých 3 - 5cm a širokých 1,5 - 2cm. Nové listy mají červenou barvu. Květy jsou malé, červené, složené ze 4 - 5ti okvětní lístků. Vykvétají v latách. Plodem je jedlá vejčitá peckovice o délce 3 - 5cm a šířce 2 - 3,5cm. Konzumuje se bez slupky. Nelze jej dlouho skladovat. V době zralosti přechází z barvy zelené do červena až fialové (výjmečně do žluta). Šťavnatá, ovšem ale poněkud moučná dužina má žlutooranžovou barvu. Obsahuje jediné větší semeno. Je bohaté na vitamíny B a C.

Potřebuje vysokou vzdušnou vlhkost, teplo a světlo.

Množí se řízky nebo semeny.

Spondias radlkoferi

Spondias tuberosa

oblasti: S Brazílie

Pochází ze severní Brazílie. Patří mezi malé stromy. Dorůstá výšky pouze 6m, ale korunu dokáže rozprostřít až do šířky 10m. Plody mají oválný tvar o velikosti 2 - 4cm. Ve zralosti mají barvu světležlutou až červenou. Povrch je kožovitý. Jeden strom dokáže vyprodukovat až 300kg plodů.

Spondias venulosa

https://www.rostliny.net/