

Aegopodium (Bršlice)

čeleď: Apiaceae

Pochází z Evropy a západní Asie. Patří mezi trvalky. Plod obsahuje 2křídle oříšky. Nejznámějším druhem je *A. podagraria*.

Množí se oddénky.

Aegopodium alpestre

synonyma: *A. alpestre* f. *scabrum*, *A. alpestre* f. *tenerum*, *A. alpestre* f. *tenuisectum*, *A. alpestre* var. *daucifolium*, *Carum alpestre*

oblasti: Čína, Himálaj, Indie, Japonsko, Pákistán, Rusko

Roste v Číně, Japonsku, Rusku, Himálaji, Indii a Pakistánu. Dorůstá výšky 30 - 50cm. Stonek je vzpřímený. Listy jsou 2 - 3x zpeřené, vlastní lístky eliptické a pilovité. Květenstvím je okolík na 4 - 15cm stopce s 6 - 12ti paprsky, vlastní květy jsou bílé a mají 3 - 8mm stopku. Plody jsou vejčité a dlouhé 3 - 4mm.

Aegopodium burtii

oblasti: Pákistán

Roste v Pakistánu jako jednoletka. Dorůstá výšky 50cm. Listy jsou 3 (i 5)tičetné, spodní jsou řapíkaté, vlastní lístky jsou eliptické až vejčité, pilovité, dlouhé 2 - 5cm a široké 1 - 2cm. Květenstvím je okolík s 6 - 12ti paprsky o délce do 2,5cm. Plody jsou dlouhé 2mm.

Aegopodium handelii

Aegopodium henryi

Aegopodium kashmiricum

synonyma: *Pimpinella kashmirica*

Aegopodium latifolium

Aegopodium podagraria (Bršlice kozí noha)

synonyma: *A. angelicifolium*, *A. podagraria* subsp. *nadeshdae*, *A. simplex*, *A. tribracteolatum*, *Apium biternatum*, *Apium podagraria*, *Carum podagraria*

oblasti: Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Irsko, Itálie, Jižní Karolína, Katalánsko, Kentucky, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island,

Saskatchewan, Severní Karolína, Švýcarsko, Tennessee, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Západní Virginie

Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 0,3 - 1 (i 1,2)m. Stonek je dutý, hranatý a rýhovaný. Listy jsou 1 - 2x zpeřené, 3četné nebo lichozpeřené, vlastní lístky mají vejčitý tvar s ostře pilovým okrajem. Kvete ve složených okolících bílými oboupohlavnými květy. Občas se používají jako listová zelenina do špenátu, protože mladé listy jsou bohaté na vitamín C. Patří mezi lehko zplevelující rostliny. Naopak v Americe patří mezi oblíbené půdokryvné rostliny. Využívá se v léčitelství. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Variegatum' - výška 60cm; nepravidelně široké béžovobílé okraje listů

Vyhovuje ji stín a lehké půdy bohaté na živiny, zejména na dusík. Dokáže se invazivně rozrůstat.

Aegopodium tadshikorum

Další informace:

http://botanika.borec.cz/brslice_kozi_noha.php

<http://botanika.wendys.cz/kytky/K13.php>

<http://botany.cz/cs/aegopodium-podagraria/>

http://cs.wikipedia.org/wiki/Br%C5%A1lice_koz%C3%AD_noha

<http://www.garten.cz/a/sk/2536-aegopodium-kozi-noha/>

http://www.jvsystem.net/app19/Species.aspx?pk=1001&lng_user=1

<http://www.kvetenacr.cz/detail.asp?IDdetail=154>

<http://www.profizahrada.cz/a/cz/4327-aegopodium-podagraria-brslice-kozi-noha/>

<https://www.rostliny.net/>