Retama (Retama)

čeleď: Fabaceae

Roste v severní Africe a jižní Evropě v podobě keře. Kvete bílými nebo žlutými květy.

Retama dasycarpa
synonyma: Genista dasycarpa, Lygos dasycarpa

Retama monosperma (Retama jednosemenná)
synonyma: Genista defoliata, Genista monosperma, Lygos monosperma, R. monosperma subsp. monosperma, Spartium clusii, Spartium dubium, Spartium gracile, Spartium monospermum, Spartium rhodorhizoides, Spartium rostratum, Spartium semperflorens, Spartium webbii

oblasti: Alžírsko, Andalusie, J Portugalsko, Kalifornie, Katalánsko, Makaronésie, Maroko

Roste v západním středozemí v podobě prutovitého keře. Dorůstá výšky 0,5 - 3m. Větve jsou slabé, převislé, ochlupené, zelené se 13ti rýhami. Listy jsou malé, horní úzce kopinaté až obvejčité, dolní 3četné, jemně ochlupené, záhy opadavé a dlouhé 0,6 - 1,5cm. Květenstvím je chudý boční 10 - 26tičetný hrozen, vlastní květy krátce stopkaté, bílé, kalich je zvonkovitý, 2pyský, zpravidla načervenalý, dlouhý 3,5mm, horní pysk má 2 3úhlé zuby, spodní 3 úzce šídlovité, koruna je dlouhá 0,8 - 1,2 (i 1,5)cm, aromatická, pavéza růžově žilkovaná a ochlupená, kosočtvercovitá, křídla podlouhlá a tupá. Plodem je mírně dužnatý obvejčitý až téměř kulatý žebernatý zploštělý krátce zobákovitý lusk délky (1 -) 1,2 - 1,6 (i 2)cm obsahující 1 - 2 (i 3) semena. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. bovei
- subsp. monosperma

Vyhovují ji pobřežní písčiny a kamenité svahy.

Retama raetam (Retama pravá)
synonyma: Genista monosperma, Genista raetam, Lygos raetam, R. raetum, Spartium raetam

oblasti: Itálie, Izrael, J Středozemí, J Španělsko, Makaronésie, Portugalsko, Sicílie, Střední Španělsko

Roste v podobě prutovitého keře na jihu středozemí a na Kanárských ostrovech. Dorůstá výšky 1 - 3,5m. Větve jsou šedozelené, rýhované a ochlupené. Listy jsou čárkovité a záhy opadávají. Kvete bílými, později béžovými vonnými květy o délce 1cm, pavéza, člunek i křídla jsou ochlupené, kalich zvonkovitý, horní pysk má 2 široké 3úhlé zuby, dolní pysk má 1 úkrojek se 3mi špičkami. Plodem je vejčitý nafouklý bledě hnědý dlouze zobákovitý špičatý lusk délky (0,7 -) 1 - 2cm obsahující 1 semeno. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. gussonei - endemit Itálie
- subsp. reatam

Vyhovuje ji plné slunce nebo polostín, teplo, hlinitopísčité půdy a přiměřený dostatek vody.

Retama rhodorhizoides

synonyma: Genista monosperma, Genista rhodorhizoides, R. microcarpa, R. recutita, R. spachii, Spartium affine, Spartium ambiguum, Spartium microcarpum

Retama sphaerocarpa

synonyma: Boelia sphaerocarpa, Boelia sphaerocarpa var. mesogaea, Genista sphaerocarpa, Lygos sphaerocarpa, R. atlantica, R. lutea, R. sphaerocarpa f. atlantica, R. sphaerocarpa var. atlantica, R. sphaerocarpa var. mesogaea, Spartium grandiflorum, Spartium sphaerocarpum

oblasti: Andalusie, Katalánsko, Portugalsko, SZ Afrika

Roste ve Španělsku, Portugalsku a severní Africe v podobě vzpřímeného hustého keře. Dorůstá výšky až 2 (i 3)m. Větve jsou v mládí vzpřímené nebo odstálé, pruhované a světle zelené. Listy jsou úzce kopinaté, záhy opadavé a vyskytují se jen na mladých exemplářích. Květenstvím je 8 - 17tičetný bohatý postranní hrozen délky 1,5 - 3cm, vlastní květy mají kalich délky 2 - 3,2mm, může být ochlupený, koruna je žlutá a má velikost 4 - 5 (i 6)mm. Plodem je lusk délky 0,7 - 0,9 (i 1,2)cm a obsahuje 1 (i 2) semena.

Další informace:
http://listnate-kere.atlasrostlin.cz/retama-prava

https://www.rostliny.net/