

Alliaria (Česnáček)

čeleď: Brassicaceae

Alliaria petiolata (Česnáček lékařský)

synonyma: A. alliaria, A. officinalis, Erysimum alliaria, Sisymbrium alliaria

oblasti: Aljaška, Andalusie, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Itálie, Jižní Karolína, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Nový Brunšvík, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Quebec, Severní Dakota, Severní Karolína, SZ Afrika, Švýcarsko, Tennessee, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Z Asie, Západní Virginie

Roste v Evropě, západní a střední Asii a severozápadní Africe. Patří mezi dvouletky (občas jednoletky). Dorůstá výšky 0,2 - 1 (i 1,3)m. Listy mají vejčitý až trojúhelníkový tvar s pilovým orkajem a srdčitou bází, délku 1 - 18cm a šířku 0,8 - 11cm. Pilová zakončení ale nejsou ostrá, ale zakulacená. Délka nepřesahuje 6cm a šířka 5cm. Při rozemnutí v listech vydávají česnekový zá�ach. Kvete v 10 - 30tičetných hroznech bílými květy se 4mi korunními páskovými lístky a dohromady vytvářejí kříž, kališní lístky mají délku 2 - 3mm a korunní jsou dlouhé 2,5 - 6mm. Plodem je šešule délky 1 - 7,5cm a šířky 1 - 2,5mm. Semena jsou černá. Využívá se v léčitelství. Dříve se používal jako hořké koření do salátů.

Vyhovuje ji stín, vlhčí vzduch a vlhká půda bohatá na živiny. Roste na okraji lesů, křovinách, rumištích, kompostech, atp.

Množí se semeny.

Další informace:

<http://botanika.wendys.cz/kytky/K7.php>

<http://botany.cz/cs/alliaria-petiolata/>

<http://www.floracr.unas.cz/floraCR/cesnacek.htm>

<http://www.garten.cz/a/cz/5654-alliaria-petiolata-cesnacek-lekarsky/>

<https://www.rostliny.net/>