

Celtis rigescens

synonyma: *Celtis asperifolia*, *Celtis nymanii*, *Celtis sumatrana*

čeleď: Ulmaceae

oblasti: Anambas Islands, Borneo, Jáva, Malajsie, Melanésie, Nová Guinea, Sulawesi (Celebes), Sumatra

Roste v jihovýchodní Asii v podobě stromu. Dorůstá výšky do 45m při průměru kmene do 1m. Borka je šedohnědá, hladká, jemně zbrázděná až bradavičnatá. Větve jsou v mládí ochlupené, pupeny jsou vejčitěkuželovité, dlouhé 3mm, široké 2mm a šupiny jsou plstnaté. Palisty jsou úzce kopinaté, dlouhé 4 - 5mm a široké 1 - 1,5mm. Listy jsou tlusté, kožovité, vrásčité, mírně vejčité až eliptické, zvlňené, v horní 1/2 řídce pilovité, špičaté, dlouhé 5 - 15cm, široké 2,5 - 7cm, báze zakulacená až prakticky srdčitá, žilnatinu tvoří 2 - 4 páry žilek, zbytek je síťnatý a řapíky jsou dlouhé 0,6 - 1cm. Květenství je samčí nebo oboupohlavné (i smíšené), dlouhé 1,5 - 5cm, listeny vejčité, dlouhé 0,5 - 1mm, široké 0,5mm, samčí květenství bohatě větvené, latnaté, samčí květy mají velikost 1,5 - 2mm, je prakticky přisedlé, obal je 4 - 5laločný, laloky eliptické, dlouhé 1 - 1,5mm, široké 1mm, oboupohlavné květenství je dlouhé 1 - 1,5cm, max. 5tkvěté, květy jsou vejčité, dlouhé 2mm, široké 1mm, laloky jsou eliptické, dlouhé 1,5mm a široké 1mm. Plodenství je dlouhé 2 - 3cm, vlastní plody jsou eliptické, ochlupené, dlouhé 1,5cm a široké 1cm.

<https://www.rostliny.net/>