

Apocynum cannabinum (Toješta konopná)

synonyma: Apocynum album, Apocynum angustifolium, Apocynum arenarium, Apocynum bebbianum, Apocynum bolanderi, Apocynum breweri, Apocynum canadense, A. f. arenarium, A. f. pennsilvanicum, A. f. pubescens, A. subsp. cordigerum, A. var. album, A. var. angustifolium, A. var. bolanderi, A. var. estellinum, A. var. floribundum, A. var. glaberrimum, A. var. greeneanum, A. var. hypericifolium, A. var. incanum, A. var. isophyllum, A. var. lanceolatum, A. var. nemorale, A. var. oliganthum, A. var. palustre, A. var. puberulum, A. var. pubescens, A. var. suksdorffii, Apocynum carolinii, Apocynum cervinum, Apocynum cinereum, Apocynum cordigerum, Apocynum cuspidatum, Apocynum densiflorum, Apocynum dictyonum, Apocynum dimidiatum, Apocynum estellinum, Apocynum farwellii, Apocynum farwellii f. anomalam, Apocynum farwellii f. ternarium, Apocynum farwellii f. verticillare, Apocynum farwellii var. glaucum, Apocynum greeneanum, Apocynum hypericifolium, Apocynum hypericifolium f. arenarium, Apocynum hypericifolium var. angustifolium, Apocynum hypericifolium var. cordigerum, Apocynum hypericifolium var. farwellii, Apocynum hypericifolium var. intermedium, Apocynum hypericifolium var. myrianthum, Apocynum hypericifolium var. nevadense, Apocynum hypericifolium var. oblongum, Apocynum hypericifolium var. salignum, Apocynum isophyllum, Apocynum ithacense, Apocynum laurinum, Apocynum littorale, Apocynum longifolium, Apocynum macounii, Apocynum missouriense, Apocynum myrianthum, Apocynum nemorale, Apocynum neogeum, Apocynum nevadense, Apocynum oblongum, Apocynum oliganthum, Apocynum palustre, Apocynum piscatorium, Apocynum platyphyllum, Apocynum procerum, Apocynum pubescens, Apocynum purpureum, Apocynum salignum, Apocynum sibiricum, Apocynum sibiricum f. arenarium, Apocynum sibiricum var. cordigerum, Apocynum sibiricum var. farwellii, Apocynum sibiricum var. salignum, Apocynum subuligerum, Apocynum suksdorffii, Apocynum suksdorffii var. angustifolium, Apocynum thermale, Apocynum tomentulosum, Apocynum venetum, Cynopaema cannabinum, Cynopaema hypericifolium, Forsteronia pavonii

čeleď: Apocynaceae

oblasti: Alabama, Alberta, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Roste v Severní Americe, zhruba od poloviny Kanady po jih USA. Dorůstá výšky 1 - 2m. Stonky jsou červené, při poranění roní mléčný latex způsobující zanícení kůže. Listy vyrůstají prostostojně, mají vejčitý tvar, délku 7 - 15cm a šířku 3 - 5cm. Spodní strana má chloupy. Kvete bílými květy s 5ti okvětními lístky. Je to jedovatá rostlina. Druhové jméno dokonce v překladu znamená: jedovatá pro psy.

Vyhovují ji vlhká místa.