

Chasmanthe

čeleď: Iridaceae

Rodové jméno vzniklo z řeckých slov chasme = rozšklebený a anthos = květ. Roste v JAR. Vytváří 1/2kulatou cibuli ze které vyrůstají mečovité listy. Květní stonky jsou pevné, mohou být chudě větvené a na vrcholu vytvářejí 2řadé květenství, vlastní květy jsou úzce trubkovité, obloukovité a horní plátek je delší spodního. Plodem je kulovitá tobolka obsahující semena s dužnatým oranžovým osemením, které je lákadlem pro ptáky.

Vyhovují mu vlhká místa. Sází se do hloubky 8 - 10cm. Teplota by neměla klesnout pod 10°C.

Množí se dceřinými cibulkami nebo semeny.

Chasmanthe aethiopica

oblasti: Kapsko, Makaronésie, Řecko, Španělsko

Roste v Kapsku v trsech, ale zavlečená byla do Španělska, Řecka, na Madeiru a Kanárské ostrovy. Dorůstá výšky 60 - 1,2m. Vytváří hlízy o průměru 5cm. Listy jsou vzpřímené a mečovité. Stonky jsou řídké větvené, zakončené jednostranným klasem délky 75cm z červených oranžových trubkovitých květů dlouhých 5cm.

Vyhovují jí jílovité půdy a teplo. Teplota nesmí klesnout pod -5°C.

Chasmanthe bicolor

oblasti: Kalifornie, Kapsko

Pochází z Kapska, ale zavlečená byla ještě do Kalifornie. Dorůstá výšky 45cm. Květenství je až 30tičetné.

Chasmanthe floribunda

oblasti: Alžírsko, Argentina, Atlantský oceán, Austrálie, Kalifornie, Kapsko, Střední středozemí

Pochází z Kapska, ale zavlečená byla do Kalifornie, Alžíru, Austrálie, Argentiny a Svatou Helenu. Dorůstá výšky 0,6 - 1 (i 1,2)m. Listy jsou úzké, mečovité, vyrůstají od báze a mají délku do 45cm. Květenství je (20 -) 25 - 40tičetné ve 2stranných klasech, vyrůstá na vzpřímeném stonku, vlastní květy jsou trubkovité na konci laločnaté a růžovočervené až červenooranžové. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *duckittii* - květy žluté
- var. *floribunda*

Odolává teplotám do -15°C.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>