

Rhododendron acuminatum (Pěnišník zašpičatělý)

čeleď: Ericaceae

oblasti: Borneo

Roste na Borneu v podobě keře nebo nízkého stromu. Dorůstá výšky 3 (i 6)m. Větve jsou chudé, ale mohutné. Listy vyrůstají ve zdánlivých 3 - 6tičetných přeslenech, jsou vejčité až vejčitěeliptické, krátce špičaté až prakticky tupé, tuhé, kožovité, tmavězelené, lesklé, v mládí oboustranně šupinaté, dlouhé 6 - 12cm, široké 2,5 - 6cm, báze zpravidla zakulacená, žilnatinu tvoří 6 - 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 2cm. Květenstvím je 7 - 15tičetný okolík, květy mají 0,8 - 1,2cm stopku, kalich pohárkovitý s mělkými 5ti laloky, průměr 2,5mm, koruna je trubkovitěnálevkovitá, červená až růžovofialová či růžvooranžová, šupinatá, dlouhá 2,5 - 2,8cm, trubka má délku 1,5 - 2cm, laloky obvejčité až prakticky kulaté, dlouhé 0,6 - 1cm a široké 5 - 8mm. Plodem je válocovitá šupinovitá tobolka délky 3 - 3,5cm a šířky 4 - 5mm.

<https://www.rostliny.net/>