Boophone

čeleď: Amaryllidaceae

Roste v jižní a východní Africe jako cibulovina. Z cibule (1/3 vyčnívá nad povrch) po odkvětu vyrůstá vějíř řemenovitých listů. Květenstvím je větší okolík, vlastní květy jsou malé, dlouze stopkaté, růžové, růžovofialové nebo červené.

Potřebuje dobře propustnou půdu. Není mrazuvzdorná.

Množí se semeny.

Boophone disticha

oblasti: Angola, Botswana, Burundi, Demokratická Republika Kongo (Zair), Free State, Gauteng, Keňa, KwaZulu-Natal, Lesotho, Limpopo, Malawi, Mosambik, Mpumalanga, Namibie, Rwanda, Súdán, Svazijsko, Tanzánie, Uganda, Východní Kapsko, Zambie, Západní Kapsko, Zimbabwe

Roste od Súdánu po JAR jako cibulovina. Cibule dorůstá průměru 5 - 18cm, je obalená suchými slupkami a může i být částečně nad povrchem. Listy vytvářejí vějíře délky 30 - 50cm, jsou šedozelené, zvlněné a špičaté. Květenstvím je hustý 50 - 100 četný okolík, vlastní květy jsou růžové až červené a aromatické.

Vyhovují ji savany a traviny.

Boophone haemanthoides

oblasti: Namibie, Západní Kapsko

Roste v Namibii a JAR. Kvete béžovými a červenými květy.

Mladé rostliny potřebují přistínění.

https://www.rostliny.net/