

Atriplex tatarica (Lebeda tatarská)

synonyma: Atriplex arazdajanica, Atriplex campestris, Atriplex diffusa, Atriplex graeca, Atriplex incisa, Atriplex lemanniana, Atriplex multicolora, Atriplex olivieri, Atriplex pruinosa, Atriplex rosea var. subintegra, A. subsp. tornabenei, Atriplex tornabenei, Atriplex tornabenei var. pedunculata, Atriplex veneta, Chenopodium tataricum, Schizotheca tatarica, Teutliopsis tatarica

čeleď: Chenopodiaceae

oblasti: Connecticut, Florida, Írán, Itálie, Jižní Amerika, Katalánsko, Kazachstán, New Jersey, New York, Pákistán, Palestina, Pamír, Pennsylvania, Polsko, Střední Evropa, Wisconsin, Z Himálaj

Roste od jižní a střední Evropy po střední Asii jako jednoletka. Dorůstá výšky (0,1 -) 0,3 - 0,8 (i 1,5)m. Stonek je vzpřímený nebo vystouparavý a bohatě větvený. Listy jsou střídavé, laločnatě zubaté, 3úhlé až kopinaté nebo kulaté, špičaté nebo zakulacené, dlouhé do 6cm, široké 3cm a dlouze řapíkaté. Květenstvím je hrozen z krátkých klásků nebo lat. Plodem je nažka, semena jsou červená průměru 1,5mm nebo hnědá průměru 1,5 - 2,5mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. pamirica/A. pamirica - jednoletka; stonek od báze větvený; výška do 25 (i 35)cm; povrch ochlupený; listy střídavé, řapíkaté, vejčité, zubaté; květenství klasnaté; semena plochá, hnědá a průměru 1 - 2mm

Vyhovují jí okraje cest.

<https://www.rostliny.net/>