

## Dipcadi (Dipkadka)

čeleď: Asparagaceae

Roste v jižní Evropě, Africe, středním východu a Indii v podobě rostliny s malou cibulkou. Květenství je větvené, vlastní květy zelené nebo hnědé.

### Dipcadi bakerianum

### Dipcadi balfourii

### Dipcadi biflorum

### Dipcadi brevifolium

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR), Mosambik, Namibie

Roste v Namibii, JAR a Madagaskaru.

### Dipcadi ciliare

Pod zemí vytváří malou cibulku. Dorůstá výšky do 40cm (v době květenství), jinak do 15cm. Listy jsou úzké, opatřené rýhou, zpravidla zkroucené a mají na okrajích jemné vlásky.

### Dipcadi concanense

### Dipcadi cowanii

### Dipcadi crispum

### Dipcadi dekindtianum

### Dipcadi erythraeum

oblasti: Afganistán, Balúčistán, Egypt, Irák, Írán, Izrael, Rádžastán, Saudská Arábie, Sindh

Roste v Egyptě, Saudské Arábii, Iráku, Íránu, Afganistánu, Pakistánu a Indii. Cibule je vejčitá, dlouhá 2 - 3cm a široká 1,5 - 2,5cm. Listy jsou vzpřímené, v počtu 5 - 6ks, dlouhé 15 - 20cm a široké 2 - 4mm. Kvete 4 - 12ti květy na 10 - 20cm stonku, listeny jsou dlouhé 7 - 9cm, stopka má délku 2 - 3mm a vlastní květy jsou dlouhé 1,2 - 1,4cm. Plody jsou přisedlé, dlouhé i široké 1,2 - 1,4cm a obsahují černá zploštělá úzce okřídlená semena velikosti 6 - 7mm.

Dipcadi fesohlense

Dipcadi garuense

Dipcadi glaucum

Dipcadi goaense

Dipcadi gourmaense

Dipcadi gracillimum

Dipcadi guichardii

Dipcadi heterocuspe

Dipcadi kuriensis

Dipcadi ledermannii

Dipcadi longifolium

Dipcadi maharashtrense

Dipcadi marlothii

Dipcadi mechowii

Dipcadi minor

Dipcadi montanum

Dipcadi ndelleense

Dipcadi oxylobum

## Dipcadi panousei

## Dipcadi papillatum

## Dipcadi platyphyllum

## Dipcadi reidii

## Dipcadi rigidifolium

## Dipcadi saxorum

## Dipcadi serotinum

oblasti: Andalusie, Francie, Itálie, Katalánsko, Makaronésie, Maroko, Nepál, Pákistán, Portugalsko, S Indie, Saudská Arábie, Z Středozemí

Roste v Makaronésii, západním středozemí, severní Africe, Saudské Arábii, Pakistánu, Indii a Nepálu. Pod zemí vytváří vejčitou cibulku délky 2 - 3,5cm a průměru 1,5 - 3 (i 6)cm. Dorůstá výšky (0,1 -) 0,2 - 0,7 (i 1)m. Stonek je přímý, postrádající listy. Listy jsou pouze přízemní, čárkovité až kopinaté, zpravidla kratší stvolu, vyrůstají po 2 - 4ks, jsou dlouhé 18 - 35cm a široké 2 - 5mm. Květenstvím je řídký (3 -) 10 - 16 (i 20)tičetný hrozen, listeny jsou kopinaté, špičaté, dlouhé 0,8 - 1,2 (i 2)cm, vlastní květy mají 0,5 - 1cm stopku, jsou trubkovité až zvonkovité, žlutohnědé nebo blědželené, dlouhé 1,2 - 1,5 (i 1,8)cm a vnější okvětní lístky jsou prakticky od báze zahnuté. Plodem je 3pouzdrá kulovitá tobolka šírky i délky 0,8 - 1 a obsahuje hnědočerná zploštělá úzce okřídlená semena velikosti 4,5 - 5mm. Existují vnitrodruhové taxonomy:

- sbsp. fulvum/var. fulvum - kvete na podzim
- sbsp. serotinum

Vyhovují mu borové lesy, křoviny, skalistá místa a dokonce i duny.

## Dipcadi susianum

oblasti: Írán

## Dipcadi turkestanicum

oblasti: Turkestán

Dipcadi ursulae

Dipcadi vaginatum

Dipcadi viride

Dipcadi welwitschii

Dipcadi x clarkeanum

Jedná se o hybrid *D. bakerianum* x *D. glaucum*.

Další informace:

<https://botany.cz/cs/dipcadi-serotinum/>

<https://www.rostliny.net/>