

Gnetum (Liánovec)

čeleď: Gnetaceae

Existuje 30 - 35 druhů. Pochází z tropů. Patří mezi stálezelené stromy, keře a především liány. Za povšimnutí také stojí, že tento rod má svoji speciální čeleď i řád. Nejznámějším druhem je G. gnemon. Dělí se na tyto skupiny:

- sect. gnetum
- subsect. gnetum
- subsect. micrognemones
- subsect. araeognemones

- sect. scandentia
- subsect. stipitati
- subsect. sessiles

Gnetum acutum

Gnetum africanum

oblasti: Z Afrika

Pochází z tropické západní Afriky. Roste v podobě liány.

Gnetum amazonicum

oblasti: Amazonas

Pochází z Jižní a střední Ameriky. Roste v podobě liány.

Gnetum arboreum

oblasti: JV Asie

Pochází z jižní Asie. Roste v podobě liány.

Gnetum bosavicum

Gnetum buchholzianum

oblasti: Z Afrika

Pochází z tropické západní Afriky. Roste v podobě liány.

Gnetum camporum

oblasti: Jižní Amerika, Střední Amerika

Pochází z Jižní a střední Ameriky. Roste v podobě liány.

Gnetum cleistostachyum

Gnetum contractum

oblasti: JV Asie

Pochází z jižní Asie. Roste v podobě liány.

Gnetum costatum

oblasti: JV Asie

Pochází z jihovýchodní Asie. Roste v podobě stromu.

Gnetum cuspidatum

Gnetum diminutum

Gnetum globosum

Gnetum gnemon (Liánovec stromovitý)

oblasti: JV Asie

Pochází z jihovýchodní Asie. Patří mezi stálezelné nízké stromy. Dorůstá výšky do 10m. Větve vyrůstají již nízko jsou husté a vytvářejí štíhlou siluetu. Na kmeni jsou žebry ve tvaru půlměsíce. Listy vyrůstají vstřícně, mají lesklý kožovitý povrch eliptického tvaru se špičkou, tmavězelenou barvu, délku do 20cm a šířku do 8cm. Kvete drobnými květy v přeslenech po 5 - 8ks a celkově jsou uspořádány do hroznů. Plodem je peckovité soudečkovitého tvaru se zašpičatěním na obou koncích. Kožovitý povrch má zprvu zelenou barvu, později žlutou nebo červenou. Jeho délka je do 3,5cm a průměr necelé 2cm. Jádru je ukryté v béžové slupce. Používají se jako zelenina. Plodit začíná ve věku 5 - 8let.

Potřebuje vlhko a teplo.

Množí se semeny.

Gnetum gnemonoides

Gnetum gracilipes

oblasti: JV Asie

Pochází z jižní Asie. Roste v podobě liány.

Gnetum hainanense

Gnetum klossii

Gnetum latifolium

oblasti: JV Asie

Pochází z jižní Asie. Roste v podobě liány.

Gnetum leptostachyum

Gnetum leyboldii

oblasti: Jižní Amerika, Střední Amerika

Pochází z Jižní a střední Ameriky. Roste v podobě liány.

Gnetum loerzingii

Gnetum luofuense

Gnetum macrostachyum

oblasti: Borneo, Jáva

Roste v jihovýchodní Asii v podobě liány. Samičím květenstvím je klasovitá šištice.

Gnetum microcarpum

Gnetum montanum

oblasti: JV Asie

Pochází z jižní Asie. Roste v podobě liány.

Gnetum neglectum

Gnetum nodiflorum

oblasti: Jižní Amerika, Střední Amerika

Pochází z Jižní a střední Ameriky. Roste v podobě liány.

Gnetum oblongum

oblasti: JV Asie

Pochází z jižní Asie. Roste v podobě liány.

Gnetum oxycarpum

Gnetum paniculatum

oblasti: Jižní Amerika, Střední Amerika

Pochází z Jižní a střední Ameriky. Roste v podobě liány.

Gnetum parvifolium

Gnetum pendulum

oblasti: JV Asie

Pochází z jižní Asie. Roste v podobě liány.

Gnetum raya

Gnetum ridleyi

Gnetum schwackeanum

oblasti: Jižní Amerika, Střední Amerika

Pochází z Jižní a střední Ameriky. Roste v podobě liány.

Gnetum tenuifolium

oblasti: JV Asie

Pochází z jižní Asie. Roste v podobě liány.

Gnetum ula

oblasti: JV Asie

Pochází z jižní Asie. Roste v podobě liány.

Gnetum urens

oblasti: Jižní Amerika, Střední Amerika

Pochází z Jižní a střední Ameriky. Roste v podobě liány.

Gnetum venosum

oblasti: Jižní Amerika, Střední Amerika

Pochází z Jižní a střední Ameriky. Roste v podobě liány.

<https://www.rostliny.net/>