

Galactites tomentosa (Bodlákovec skvrnitý)

čeleď: Asteraceae

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Baleáry, Černá Hora, Egejské ostrovy, Francie, Itálie, Katalánsko, Korsika, Kréta, Makaronésie, Maroko, Řecko, Sardínie, Sicílie, Tunisko, Velká Británie

Roste ve středozeří včetně Kanárských ostrovů, Madeiry a Azorů v podobě jednoletky nebo dvouletky. Dorůstá výšky (0,1 -) 0,2 - 0,8 (i 1)m. Povrch je bíle plstnatý. Stonek je vzpřímený, brázditý a nevětvený. Přízemní listy jsou střídavé, bíle mramorované, na spodní straně plstnaté, zubaté, ostré, přízemní obkopinaté, pilovité, záhy zasychající, lodyžní jsou střídavé, peřenosečné s 1,5 - 6 (i 8)mm dlouhými ostny a 3úhlými úkrojky. Květenstvím je modrofialový úbor průměru (1 -) 1,2 - 1,5 (i 2,2)cm, zákrov je vejčitý, dlouhý 1 - 1,2cm, zákrovní listy ochlupené s dlouhým nazelenalým ostnem s tmavou skvrnou, květy dlouhé 2,5cm, oboupohlavné a trubkovité. Plodem je válcovitá pruhovaná nažka délky (3,5 -) 4 - 6mm s chmýrem délky 1,4 - 1,7cm.

Vyhovují mu pastviny, úhory a jiná málo zarostlá místa.

<https://www.rostliny.net/>