

Hainardia

čeleď: Poaceae

Existuje pouze 1 druh.

Hainardia cylindrica

synonyma: *Lepturus cylindricus*, *Lepturus cylindricus* var. *asperulus*, *Lepturus cylindricus* var. *cylindricus*, *Lepturus cylindricus* var. *gracilis*, *Lepturus ramosus*, *Lepturus simplex*, *Lepturus subulatus*, *Monerma cylindrica*, *Monerma cylindrica* var. *gracilis*, *Monerma monandra*, *Monerma ramosa*, *Monerma simplex*, *Monerma subulata*, *Ophiuros cylindricus*, *Rottboellia adscendens*, *Rottboellia cylindrica*, *Rottboellia ramosa*, *Rottboellia subulata*

oblasti: Afrika, Albánie, Alžírsko, Andalusie, Argentina, Arménie, Asie, Austrálie, Ázerbájdžán, Baleáry, Balkánský poloostrov, Brazílie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Čile, Evropa, Francie, Gruzie, Iberský poloostrov, Írán, Itálie, J Evropa, J Jižní Amerika, J Španělsko, J USA, Jižní Amerika, Jižní Karolína, Jugoslávie, JV Evropa, JV USA, JZ Asie, JZ Evropa, JZ USA, Kalifornie, Kanárské ostrovy, Katalánsko, Korsika, Kréta, Krym, Kypr, Libanon, Libye, Louisiana, Madeira, Makaronésie, Malta, Maroko, Nový Zéland, Oregon, Portugalsko, Řecko, S Afrika, Sardínie, Severní Amerika, Sicílie, Slovinsko, Střední Evropa, Střední Severní Amerika, Střední střeozemí, Střeozemí, SV Španělsko, Sýrie, SZ Afrika, SZ USA, Španělsko, Texas, Tichý oceán, Tunisko, Turecko, Uruguay, USA, V Evropa, V Jižní Amerika, V Střeozemí, Z Asie, Z Evropa, Z Jižní Amerika, Z Střeozemí

Pochází ze střeozemí od Madeiry a Kanárských ostrovů po Krym a Írán, zavlečená byla do Austrálie, Nového Zélandu, USA i do Jižní Ameriky. Stonek je větvený a dorůstá výšky 4 - 37 (i 50)cm.

Vyhovují ji zasolená místa v zásadité bahité půdě.

<http://www.rostliny.net/>