

Chenopodium berlandieri (Merlík Berlandierův)

synonyma: *Botrys berlandieri*, *Chenopodium album* var. *berlandieri*, *C. f. angustius*, *C. f. ficifoliforme*, *C. f. grossidentatum*, *C. f. latifolium*, *C. f. sinuatum*, *C. f. subhastatum*, *C. subsp. esauae*, *C. subsp. ludwigianum*, *C. subsp. nuttalliae*, *C. subsp. pseudopetiolare*, *C. subsp. yucatanum*, *C. var. coloradense*, *C. var. foetens*, *C. var. opulifoliforme*, *Chenopodium texanum*

čeled': Chenopodiaceae

oblasti: Alabama, Alberta, Aljaška, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Mexiko, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon, Západní Virginie

Pochází z USA a Mexika. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *berlandieri*
- var. *boscianum*
- var. *bushmanum*
- 'Huazontle'
- 'Chia'
- var. *macrocalycum*
- subsp. *nuttalliae*
- 'Quelite'
- var. *sinuatum*
- var. *zschackii* - listy kosočtvercové až vejčité, 3laločné

<https://www.rostliny.net/>