

Chenopodium botrys (Merlík hroznový)

čeleď: Chenopodiaceae

oblasti: Alabama, Andalusie, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Čína, Delaware, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, J Evropa, Jižní Dakota, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kazachstán, Kentucky, Kolorado, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Severní Dakota, Severní Karolína, Středozemí, SZ Indie, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Roste v jižní Evropě a jihozápadní Asie až po Čínu jako jednoletky. Dorůstá výšky (5 -) 10 - 60 (i 70)cm. Stonek je vzpřímený, bohatě větvný a společně s listy žláznatě ochlupený a lepkavý. Listy jsou zelené, vejčité až eliptické s hlubšími 2 - 5ti laloky podél krajů, dlouhé 1 - 7cm, báze uťatá až mírně srdcitolité. Květenství je široké do 5cm, vrcholové, vrcholové květy jsou samostatné, vlastní květy jsou obouphlavné s 5ti korunními lístky. Plodem je nažka. Plody jsou černé, kulovité a velikosti 0,6 - 0,8mm. Patří mezi chráněné druhy C2.

Vyhovují mu skládky, rumiště, písečné náplavy, atp. Nevedí mu vyšší koncentrace solí.

<https://www.rostliny.net/>