

Chenopodium chenopodioides (Merlík slanomilný)

synonyma: Agathophytum crassifolium, Agathophytum humifusum, Blitum botryoides, Blitum chenopodioides, Blitum crassifolium, Blitum polymorphum var. crassifolium, Blitum rubrum var. crassifolium, Chenopodium album subsp. concatenatum, Chenopodium astrachanicum, Chenopodium botryodes, Chenopodium botryoides, C. var. degenianum, C. var. lengyelianum, Chenopodium concatenatum, Chenopodium crassifolium, Chenopodium crassifolium var. degenianum, Chenopodium crassifolium var. lengyelianum, Chenopodium rubrum var. botryoides, Oxybasis minutiflora

čeleď: Chenopodiaceae

oblasti: Britská Kolumbie, Česká republika, Idaho, Itálie, JZ Asie, Kalifornie, Katalánsko, Kolorado, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, Oregon, Palestina, Střední Asie, Texas, Utah, V Sibiř, Washington, Wyoming

Pochází zřejmě ze střední a jihozápadní Asie. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky (10 -) 15 - 50 (i 80)cm. Stonek má rýhovaný, bohatě větvený a červenozelený. Tlustší listy má variabilní, široce trojúhelníkové s vroubkovaně pilovým okrajem, délkou 3 - 4 (i 9)cm, šířkou snad až 7cm, tmavězelenou barvou se světlejším žilkováním a dlouhým řapíkem. Kvete v klubíčkových lichopřeslenech na koncích stonků oboupohlavnými květy červenozelené barvy. Plodem je nažka obsahující semena průměru 1mm. U nás patří mezi nejasné druhy A2.

Potřebuje půdy s vysokým obsahem solí. Roste u břehů rybníků, ale má raději sušší půdy.

<https://www.rostliny.net/>