

Leptochloa (Větvenka)

čeleď: Poaceae

Roste v Asii, Africe, Austrálii i Americe. Rodové jméno pochází z řeckých slov leptos = tenký a chloa = tráva. Odvolává se tím na květenství.

Leptochloa aquatica

oblasti: Mexiko

Roste v Mexiku.

Leptochloa asthenes

oblasti: Austrálie

Roste v Austrálii.

Leptochloa barbata

oblasti: Argentina, Paraguay

Roste v Paraguayi a Argentině.

Leptochloa caerulescens

Leptochloa caudata

oblasti: V Afrika

Roste ve východní Africe.

Leptochloa chinensis (Větvenka čínská)

oblasti: Čína, Indie, J Korea, Japonsko, Melanésie, Nový Jižní Wales, Papua-Nová Guinea, Queensland, Svazijsko, Tichý oceán, V Afrika, Z Afrika

Roste v Číně, jihovýchodní Asii, Austrálii, Svazijsku, západní Africe a v tichomoří.

Leptochloa chloridiformis

oblasti: Argentina, Paraguay, Texas, Uruguay

Roste v Argentině, Paraguayi a Uruguayi.

Leptochloa decipiens

oblasti: Austrálie, Jižní Karolína, Mississippi

Pochází z Austrálie.

Leptochloa digitata

oblasti: Austrálie, Jižní Karolína

Pochází z Austrálie.

Leptochloa divaricatissima

oblasti: Austrálie, Jižní Karolína

Pochází z Austrálie.

Leptochloa dubia

oblasti: Arizona, Florida, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kolorado, Maryland, Mississippi, Missouri, Nové Mexiko, Oklahoma, Severní Karolína, Texas

Leptochloa eleusine

Leptochloa fusca

oblasti: Alabama, Andalusie, Arizona, Arkansas, Austrálie, Britská Kolumbie, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Paňdžáb (pakistánský), Pennsylvania, Portoriko, Quebec, Rhode Island, Severní Dakota, Severní Karolína, Sindh, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Roste v tropech a subtropích jako vodní vytrvalá tráva. Dorůstá výšky (0,6 -) 0,9 (i 1,5)m. Větví se i zakořeňuje od spodních kolének. Listy jsou tuhé, čárkovité, dlouhé 25 - 55cm a široké do 5mm. Květenstvím je 10 - 30tikvětý hrozen délky 20 - 35cm, klásky jsou 6 - 11tikvěté, eliptické a dlouhé 0,8 - 1,5cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. fascicularis
- subsp. muelleri
- subsp. uninervia

Leptochloa gigantea

Leptochloa ligulata

oblasti: Queensland

Pochází z Austrálie.

Leptochloa longa

oblasti: Karibik, Panama

Pochází z Panamy a Trinidadu.

Leptochloa malayana

oblasti: Borneo, Malajsie, Thajsko

Pochází z Thajska, Bornea a Malajsie.

Leptochloa marquisensis

Leptochloa monticola

oblasti: Hispaniola

Pochází z Hispanioly.

Leptochloa mucronata (Větvenka nitkovitá)

oblasti: Arkansas, Bolívie, Ekvádor, Galapágy, Georgia, Illinois, Kansas, Karibik, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Peru, Tennessee, Texas

Roste od USA až po sever Jižní Ameriky.

Leptochloa nealleyi

oblasti: Arizona, Louisiana, Mexiko, Portoriko, Texas

Roste v USA a Mexiku.

Leptochloa neesii

oblasti: Austrálie, Indie, Jáva, Melanésie, Myanmar (Barma), Srí Lanka

Roste v Austrálii, Moluckých ostrovech, Jávě, Myanmaru, Indii a Srí Lance.

Leptochloa obtusiflora

Leptochloa panicea

oblasti: Alabama, Arizona, Arkansas, Austrálie, Chajbar Paštúncwá, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Dakota, JV Asie, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Kolorado, KwaZulu-Natal, Louisiana, Massachusetts, Mississippi, Missouri, Nevada, New Jersey, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Paňdžáb (pakistánský), Pennsylvania, Portoriko, Severní Karolína, Sindh, Súdán, Tennessee, Texas, Transvaal, Utah, Virginie, Z Afrika

Roste v tropické Americe a Asii jako plazivá nebo vystoupavá jednoletka, zavlečená byla do Afriky a Austrálie. Listy jsou čárkovité, dlouhé do 25cm, široké 7mm, báze je sbíhavá a pochvy jsou z obou stran ochlupené. Květenství je eliptické až podlouhlé, zpravidla narůžověle fialové, dlouhé 20 - 30cm, tvořené mnoha vystoupavými hrozny délky 4 - 11cm, klásky bývají (2 -) 3 (i 5)tkvěté, úzce eliptické a dlouhé 0,2 - 2,5cm.

Leptochloa panicoides

oblasti: Alabama, Arkansas, Brazílie, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Kentucky, Kolumbie, Louisiana, Mississippi, Missouri, Peru, Portoriko, Tennessee, Texas, Virginie

Roste od USA po Kolumbii, Peru a Brazílii.

Leptochloa rupestris

Leptochloa scabra

oblasti: Alabama, Louisiana, Paraguay, Portoriko

Roste od USA po Paraguay.

Leptochloa simoniana

oblasti: Nová Guinea, Queensland

Roste na Nové Guineji a v Austrálii.

Leptochloa southwoodii

oblasti: Queensland

Roste v Austrálii.

Leptochloa squarrosa

oblasti: Madagaskar, Tanzánie

Roste v Tanzánii, Komorských ostrovech a Madagaskaru.

Leptochloa srilankensis

oblasti: Srí Lanka

Roste na Srí Lance.

Leptochloa tectoneticola

oblasti: Jáva, Kambodža, Thajsko

Roste v Kambodži, Thajsku a Jávě.

Leptochloa uniflora

Leptochloa virgata

oblasti: Florida, Havajské ostrovy, Jižní Karolína, Paraguay, Portoriko, Texas

Roste od USA po Paraguay.

Leptochloa viscida

oblasti: Arizona, Chihuahua, Kalifornie, Kalifornský záliv, Kalifornský záliv sever, Nové Mexiko, Sinaloa, Sonora, Texas

Roste v USA a Mexiku.

Leptochloa xerophila

<https://www.rostliny.net/>