

Lygeum (Albardín)

čeleď: Poaceae

Existuje pouze 1 druh.

Lygeum spartum (Albardín štětínovitý)

synonyma: *L. spartum* f. *longispathum*, *L. spathaceum*

oblasti: Alžírsko, Andalusie, Baleáry, Egypt, Itálie, Kašmír, Katalánsko, Kréta, Libye, Maroko, Pákistán, Sardínie, Sicílie, Sinajský poloostrov, Tunisko

Roste ve středozeší ve stepích v severní Africe a jižní Evropě jako trvalka. Dorůstá výšky (20 -) 60 - 80 (i 90)cm. Oddenek s bází stonku je šupinatý a kořenový systém je rozsáhlý. Stonek je přímý, nitkovitý, tuhý a dlouhý do 50cm, Listy jsou nitkovité, tuhé, v horní části obloukovité, dlouhé do 50cm a široké 1,5mm. Květenství tvoří 2 - 3 klásky opatřené na bázi velkým množstvím chloupků s délkou do 4,5cm, listeny jsou 2, světlebéžové, dlouhé 3 - 4 (i 9)cm, vlastní klásky jsou 2květé, bez plev, pluchy jsou v dolní části trubkovité, ochlupené a květy mají plušky délky 3 - 4cm. Plodem je obilka.

Vyhovuje mu prostředí stepi se suchou písčitou vápenitou i zasolenou půdou.

Další informace:

<https://botany.cz/cs/lygeum-spartum/>

<https://www.rostliny.net/>