

Heritiera littoralis (Heritiera pobřežní)

čeleď: Malvaceae

oblasti: Filipíny, Havajské ostrovy, Indie, Indonésie, J Čína, J Japonsko, Kambodža, Keňa, Madagaskar, Malajsie, Mosambik, Nová Guinea, Somálsko, Srí Lanka, SV Austrálie, Tanzanie, Tchaj-wan, Vietnam

Roste v tropech od východní Afriky přes Indii a Srí Lanku po jihovýchodní a východní Asii a oceánii v podobě jednodomého stálezeleného stromu. Dorůstá výšky 4 - 15 (i 25)m, šířky 12m při průměru kmene 0,5 - 2m. Báze má lištovité náběhy a borka je šedobílá. Větve bývají v mládí bíle šupinaté. Palisty jsou kopinaté a opadavé. Listy vyrůstají střídavě ve spirále, jsou kopinaté, vejčité nebo eliptické, kožovité, tmavězelené, mohou být zvlněné, dlouhé 8 - 35cm, široké 3 - 12cm, spodní strana stříbřitě bíle šupinatá a řapíky jsou dlouhé 1 - 2cm. Květenstvím je úžlabní ochlupená lata délky 5 - 12cm, vlastní květy jsou bílé, načervenalé až žlutozelené, dvoudomé, malé, kalich zvonkovitý, hnědočervený s 5ti krátkými 3úhlými cípy, dlouhý (4 -) 5 - 6mm a koruna chybí. Plodem je eliptický dřevnatý tmavě hnědý kýlovitý oříšek délky 5 - 7cm a šířky 3 - 5cm.

<https://www.rostliny.net/>